



Num. 548. Publicado el 28/09/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Otala punctata*. Por José Rafael González López



Num. 548. Publicado el 28/09/2015

Descripciones de especies

Verbascum thapsus L.

Hierba bienal, tomentosa, con tallos de (30)40-150(200) cm, lisos, simples, a veces muy robustos, con indumento denso, persistente, verdoso o ceniciento...

Terrenos incultos, cunetas, pistas forestales, reposaderos de ganado, en ambientes antropizados, con frecuencia en suelos pedregosos de lugares soleados...

Europa -excepto la Península Balcánica- y Asia central, hasta el Altai. Principalmente, mitad N de la Península -excepto Galicia- y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-thapsus.html>

Saxifraga caesia L.

Planta perenne, pulvinar-cespitosa, formada por numerosas rosetas de c. 0,4-0,7(1) cm de diámetro, con indumento de glándulas esféricas o más o menos...

Suelos pedregosos, fisuras y rellanos de roquedos calizos; (1430)1800-2200(2500) m....

Montañas del C y S de Europa (Pirineos, Cárpatos, Alpes, Apeninos, Balcanes, etc.). Pirineos central y oriental. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-caesia.html>

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)

Decápodo con un cefalotórax liso, con dos pares de crestas post-orbitales, presentando una espina apical en el par anterior. y un marcado surco branquial...

Pacifastacus leniusculus se encuentra desde la zona costera a la región subalpina en ríos, arroyos, lagos e incluso aguas salobres, mostrando una preferencia...

Es originario de América del Norte (Suroeste de Canadá y Noroeste de Estados Unidos). Se introdujo en Suecia, en 1960, para que ocupara el nicho ecológico...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pacifastacus-leniusculus.html>

Otala lactea subsp. murcica (Rossmässler, 1854)

Concha con un diámetro de 30 a 40 mm y una altura de 16 a 22 mm. Lisa, deprimida globulosa, convexa por encima y abombada por debajo, 6 y media a 6 v...



Vive en una gran diversidad de hábitats incluso en lugares secos y soleados, bajo piedras y en vegetación, en páramos matosos y estepas, rocosos, most...

Esta subespecie se encuentra distribuída por el SE ibérico, apareciendo en Almería, Murcia y el Levante. La distribución para la subespecie *Otala lact...*

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-murcica.html>

Lyophyllum transforme (Britzelm.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 40-70 mm de diámetro, convexo, con un margen enrollado cuando es joven, más tarde extendido y más o menos deprimido, con la s...

Crece en bosques de planifolios y coníferas, generalmente formando fascículos, durante el otoño....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lyophyllum-transforme.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aspidapion aeneum (Fabricius 1775) (Arthropoda)

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori (Magnoliophyta)

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Volvariella pusilla (Pers.) Singer (Basidiomycota)

