



Num. 554. Publicado el 09/11/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Amanita strangulata*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 554. Publicado el 09/11/2015

Descripciones de especies

Russula fellea (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 3-8 cm de diámetro, inicialmente globoso, después plano convexo, con el margen incurvado, acanalado; la cutícula es viscosa...

Crece en bosques de planifolios, generalmente de *Fagus sylvatica* y menos frecuentemente en coníferas, durante verano y otoño....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-fellea.html>

Ribes uva-crispa L.

Arbusto de 0,5-1,5 m, espinoso, con tallos más o menos intrincados y provistos de aguijones casi siempre ternados. Hojas de (0,7)1-4(4,5) cm de anchura...

Matorrales bajo bosques caducifolios aclarados, ribazos, setos, espinares, barrancos umbrosos, roquedos; 700-2000 m....

Casi toda Europa, hasta Asia central (por el S, hasta el Himalaya), China y N de África (Marruecos y Argelia), cultivado y naturalizado en América bo...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ribes-uva-crispa.html>

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quéf.

Macroscopía. Sombrero de 15-28 mm de diámetro, más o menos hemisférico, más raramente cónico campanulado o campanulado, en ocasiones con un pequeño um...

Especie común, coprófila en estiércol de animales herbívoros, vaca y caballo principalmente....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/panaeolus-papilionaceus.html>

Cyperus esculentus L.

Planta herbácea perenne, con un rizoma de casi 1 mm de diámetro, con escasas escamas pequeñas y estrechas, que emite abundantes raíces fibrosas; tubér...

Terrenos sueltos, húmedos, cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....

Pantropical, que alcanza la región atlántica de Norteamérica y el Mediterráneo. Dispersa acá y allá por la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-esculentus.html>



Asphodelus serotinus Wolley-Dod

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, alargado y desprovisto de restos fibrosos. Raíces con la parte proximal de mayor diámetro que la...

Claros de bosque -encinar, alcornocal, quejigar, melojar, eucaliptal y pinar-, matorral -jaral- y pastizales, taludes, en suelos poco desarrollados co...

Principalmente en el C y O de la Península Ibérica, más rara en el N...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-serotinus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amanita dryophila Consiglio & Contu (Basidiomycota)

Amanita strangulata (Fr.) Qué. (Basidiomycota)

Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773) (Arthropoda)

Clytus rhamni Germar, 1817 (Arthropoda)

Creoleon lugdunensis (Villers, 1789) (Arthropoda)

Hemipenthes velutina Meigen, 1820 (Arthropoda)

Lasius flavus (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Polyplax spinulosa (Burmeister, 1839) (Arthropoda)

Ranunculus sceleratus L. (Magnoliophyta)

Squamanita paradoxa (A.H. Sm. & Singer) Bas (Basidiomycota)

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

