



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 56. Publicado el 02/01/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Platystomum compressum*. Por Enrique Rubio Domínguez



9 771887 506008

Num. 56. Publicado el 02/01/2006

## Descripciones de especies

### *Musculus costulatus* (Risso, 1826)

Concha ovalada, con extremos anterior y posterior truncados, con umbos subterminales, de hasta 12 mm de longitud. Tiene 2 grupos de costillas radiales...

En fondos arenosos o pedregosos en zonas poco profundas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y el oeste de África....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/musculus-costulatus>

### *Hydroides norvegica* Gunnerus, 1768

Poliqueto de hasta 3 cm de longitud, que vive en tubos calcificados blanquecinos, de sección cuadrangular o trapezoidal, a veces con quilla y muchas ...

Sobre sustratos duros, formando grandes colonias sobre piedras, conchas o estructuras portuarias, hasta los 300 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hydroides-norvegica>

### *Helicolenus dactylopterus* (Delaroche, 1809)

Pez fusiforme, de hasta 30 cm de longitud. Cabeza grande, sin prolongaciones digitiformes o depresión occipital, de la que es notable sus grandes ojo...

En fondos fangosos, donde se alimenta de crustáceos, cefalópodos, equinodermos y otros peces, entre 150 y 1000 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sudáfrica. De Canadá a Venezuela....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/helicolenus-dactylopterus>

### *Entelurus aequoreus* (Linnaeus, 1758)

Pez alargado y delgado, que puede llegar a los 60 cm de longitud. La boca, pequeña y dirigida hacia arriba, está situada al final de un largo y afil...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Vive entre algas en aguas poco profundas. Al igual que otras especies de la familia, es el macho quien lleva los huevos en una bolsa incubadora hasta ...

Desde Islandia y Noruega a las Azores....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/entelurus-aequoreus>

## *Ctenolabrus rupestris* (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado, de sección redondeada, de hasta 18 cm de longitud. Cabeza y boca pequeña, provista de pequeños dientes en varias filas de l...

Hasta 50 m de profundidad, presente en agujeros o zonas verticales, generalmente sombreadas. Se alimenta de briozoos, crustáceos y gasterópodos....

Desde Noruega al Mediterráneo y Marruecos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ctenolabrus-rupestris>

## *Colus gracilis* (da Costa, 1778)

Concha cónica, fusiforme, con 8 o 10 vueltas de espira aplanadas, de hasta 5 cm de altura y 2 de ancha. Tiene una estriación bastante fina. La proto...

En zonas fangosas, entre 30 y 200 m de profundidad. Tiene hábitos carroñeros....

Desde Noruega a Portugal....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/colus-gracilis>

## *Clava multicornis* (Forsskål, 1775)

Hidrozoos de fácil identificación al formar colonias de ejes erectos de 2 o 3 cm de altura, no ramificados, unidos por estolones y de color blanco, r...

Normalmente en ...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/clava-multicornis>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Aplidium proliferum* (Milne Edwards, 1841)

Ascidia que forma colonias carnosas ovoidales, ligeramente mazudas, de color transparente, grisáceas, amarillentas o anaranjadas, de hasta 5 cm de al...

En aguas poco profundas, hasta unos 50 m de profundidad, sobre piedras, conchas o algas....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/aplidium-proliferum>

## *Acrosorium ciliolatum* Kylin (Harv.)

Alga roja formada por talos postrados o erectos; los primeros son cintas lobuladas y fijadas por numerosos hapterios y de las que se desarrollan los t...

Hasta 30 m de profundidad, sobre estipes de *Laminaria hyperborea*, o *Corallina*, en zonas arenosas o también en invertebrados, tanto en zonas expuestas...

Desde las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo. En el Atlántico occidental, desde Estados Unidos a Brasil....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/acrosorium-ciliolatum>

## *Abra alba* (W.Wood, 1802)

Concha delicada, ovalada, de hasta 2 cm de longitud y brillante, con estriaciones concéntricas y radiales finas y con el umbo posterior. Charnela het...

En fondos arenosos o fangosos, hasta 60 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/abra-alba>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Arca tetragona* Poli, 1795 (Mollusca)

*Erica arborea* L. (Chloroplastida)





**asturnatura**

# Revista asturnatura.com

*Matthiola incana* (L.) R. Br. in Aiton (Chloroplastida)

*Mugil cephalus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

