



Num. 564. Publicado el 18/01/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Helvella juniperi*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 564. Publicado el 18/01/2016

Descripciones de especies

Phaeomarasmium rimulincola (Rabenh.) P. D. Orton

Macroscopía. Sombrero de cóncavo a hemisférico, de 2-5 mm de diámetro; cutícula lobulado acanalada, de pardo a ocrácea, con escuámulas o flocones conc...

Crece durante el otoño en cortezas de árboles caducifolios y esclerófilos, como Quercus, Salix, Fraxinus, Ulmus,.....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phaeomarasmium-rimulincola.html>

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Coleóptero de una longitud de 7-12 mm, de coloración general negra, excepto los élitros que son de color rojo uniforme, y el pronoto, que es rojo con ...

Los adultos suelen encontrarse en flores expuestas al sol o entre las hojas de las plantas de bajo crecimiento. Las larvas se alimentan de pequeños in...

La mayor parte de Europa, Asia y África del Norte....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lygistopterus-sanguineus.html>

Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga

Macroscopía. Sombrero de 35-80 mm, de joven hemisférico, convexo, cónico truncado, que se expande a de campanulado a plano convexo, con un umbo aplanado...

Crece de forma solitaria o formando pequeños de forma saprófita en suelos arenosos cerca de arbustos, como dunas o zonas herbosas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-barssii.html>

Hyoscyamus albus L.

Hierba perenne, bienal o anual, densamente pubescente, con pelos pluricelulares largos, blancos, y pelos cortos glandulosos y eglandulosos. Tallos ha...

Bordes de caminos, pedregales, roquedos, paredes, muros y escombreras, en substrato nitrificado y preferentemente básico; 0-1300 m....

S de Europa, SW de Asia, N de África y Ma ca ro ne sia -excepto Cabo Verde-. Casi toda la Península Ibérica, poco frecuente en el N e Islas Baleares...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hyoscyamus-albus.html>

Carex diandra Schrank

Planta herbácea laxamente cespitosa, aunque en raras ocasiones puede formar un césped algo denso. Tallos de 20-60(100) cm, trígonos, con los ángulos a...

Bordes de lagos en áreas de montaña; 1600-1900 m....

Regiones templadas y frías de Eurasia y Norteamérica; también en Nueva Zelanda. En la Península es muy escasa y solo se conoce de unas pocas localidades...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-diandra.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. (Basidiomycota)

Chaetocalathus craterellus (Durieu & Lév.) Singer (Basidiomycota)

Lygistropterus sanguineus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Scaeva selenitica (Meigen, 1822) (Arthropoda)

Sidera vulgaris (Fr.) Miettinen (Basidiomycota)

Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quéf. (Basidiomycota)

Trypocoprís pyrenaicus (Charpentier, 1825) (Arthropoda)

