



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 567. Publicado el 08/02/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dicyrtomina saundersi*. Por José Rafael González López



Num. 567. Publicado el 08/02/2016

## Descripciones de especies

### *Sorbus latifolia* (Lam.) Pers.

Árbol de hasta 10 m con ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cortezaescamosa, gris; yemas 5-9 mm, ovoides, subagudas, con 4-5 escamas...

Robledales, fresnedas, saucedas y setos; en todo tipo de substratos; 500-1000 m....

W, C y S de Europa -desde Gran Bretaña y la Península Ibérica hasta Hungría-; y ¿NW de África? NE y C de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sorbus-latifolia>

### *Rumex crispus* L.

Planta perenne, de hasta 1,3(2,5) m. Tallos uno o varios por pie, erectos, estriado-asurcados. Hojas basales (35)60-260(500) x (7)10-70(140) mm, oblong...

Pastos húmedos nitrificados, cunetas, ribazos, bordes de cursos de agua y medios frescos alterados, en general; 0-2000 m....

Subcosmopolita. Repartida por toda la Península Ibérica y las Bateares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rumex-crispus>

### *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco

Árbol de hasta 100 m de altura y 440 cm de diámetro con la copa anchamente cónica que típicamente se vuelve aplanada o irregular con la edad; much...

En España aparece como planta ornamental y en algunas repoblaciones en puntos del norte, noroeste y Sistema Central. ...

Originaria del O de Norteamérica, desde la Columbia Británica, en el suroeste de Canadá hasta la zona central de California, en el suroeste de Esta...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pseudotsuga-menziesii>

### *Pimelia baetica* Solier, 1836

Coleóptero tenebriónido con una longitud de 17 a 20 mm, de cuerpo globoso y de coloración negra. En la cabeza, antenas con el tercer antenómero cu...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Especie típica de ambientes xerófilos....

Sur de la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pimelia-baetica>

## *Coris monspeliensis* L.

Planta erecta, rara vez de porte almohadillado, con el tallo principal de (5)10-25(40) cm. Hojas de (2)4-9(20) x 0,4-1,2(2) mm, erecto-patentes o refl...

Romerales, tomillares y otros matorrales termófilos, en general sobre substrato básico; 0-1400(1700) m....

Región mediterránea europea y N de África. Por toda el área mediterránea de la Península Ibérica e Islas Baleares. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/coris-monspeliensis>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Bibio pomonae* Fabricius, 1775 (Arthropoda)

*Bryocentria metzgeriae* (Ade & Höhn.) Döbbeler (Ascomycota)

*Dicyrtomina saundersi* (Lubbock, 1862) (Arthropoda)

*Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801) (Arthropoda)

*Pimelia baetica* Solier, 1836 (Arthropoda)

*Sorbus latifolia* (Lam.) Pers. (Chloroplastida)

*Tricharina ochroleuca* (Bres.) Eckblad (Ascomycota)

