



Num. 568. Publicado el 15/02/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dicyrtomina saundersi*. Por José Rafael González López



Num. 568. Publicado el 15/02/2016

Descripciones de especies

Salvia officinalis L.

Subarbusto hasta de 60 cm, con tallos ramificados, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, con pelos tector...

Localmente naturalizada procedente de antiguos cultivos en la Península Ibérica y adventicia en las Islas Baleares; 0-150 m. ...

Especie originaria de la Península Balcánica. Dispersa en la Península Ibérica y Baleares...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/salvia-officinalis>

Parageron incisus Wiedemann, 1830

Díptero de pequeño tamaño, que alcanza como máximo 1 cm de longitud, siendo la hembra ligeramente mayor que el macho. En la cabeza destaca un pico...

Vive fundamentalmente en zonas de matorral, herbazales y pastizales efímeros, hasta los 2.500 metros de altitud. Los adultos se alimentan del néctar...

Países mediterráneos de Europa. En la Península Ibérica ha sido citada en distintas provincias españolas y en Portugal sólo en el Algarve....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/parageron-incisus>

Myriophyllum alterniflorum DC.

Planta monoica con tallos de hasta de 1,5 m, ramificados, verdes, amarillentos orojizos. Hojas de 6-30 mm, más cortas o ligeramente más largas que ...

Lagunas, marjales, charcas, navajos, en aguas limpias y oligotróficas; generalmente sobre substratos pobres en bases, 0-2000 m....

Europa, Groenlandia, N de África. Dispersa por gran parte de la Península. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/myriophyllum-alterniflorum>

Dicyrtomina saundersi (Lubbock, 1862)

Pequeño colémbolo de aspecto globoso, con un tamaño de 2 - 3 mm y con el cuerpo recubierto de un patrón de manchas distintivas amarillas,





asturnatura

Revista asturnatura.com

verdosas...

Generalmente se encuentra bajo piedras, hojas, siendo difícil de ver por su pequeño tamaño....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dicyrtomina-saundersi>

Carex paniculata subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire

Planta densamente cespitosa, formadora de grandes macollas. Tallos 40-130(150) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos entre los 3/4 y 1/4...

Bordes de ríos y arroyos, alisedas y prados higroturbosos; 0-1600 m. ...

Península Ibérica, Marruecos y SW de Francia. Mitad W de la Península Ibérica. ...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-paniculata-subsp-lusitanica>

Novedades corológicas

Epibryon plagiochilae (Gonz. Frag.) Döbberler (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 14/02/2016

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos//24231.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan 1763) (Arthropoda)

Andricus kollari (Hartig, 1843) (Arthropoda)

Epibryon plagiochilae (Gonz. Frag.) Döbberler (Ascomycota)

Geotrupes puncticollis Malinowsky 1811 (Arthropoda)

Octosporella jungermanniarum (P. Crouan & H. Crouan) Döbberler (Ascomycota)

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (Chloroplastida)

