



## Num. 571. Publicado el 07/03/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Rhamnus alaternus*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 571. Publicado el 07/03/2016**

## Descripciones de especies

### *Ricinus communis* L.

Arbusto que puede alcanzar 3 m, arbolillo hasta de 5(7) m o, raramente, hierba anual muy robusta. Tallos nudosos, glaucos, a menudo rojizos. Hojas de 1...

Terrenos baldíos, herbazales nitrófilos y lugares ruderalizados; indiferente a la naturaleza del substrato; 0-300 m....

Originaria de África tropical, se ha cultivado y naturalizado en gran parte de la región mediterránea. Cultivada desde antiguo para el aprovechamiento...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ricinus-communis.html>

### *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.

Hierba vivaz con una cepa de (3)7-20 mm de diámetro, a menudo corta y subtuberosa, no ramificada o raramente un poco en el ápice; tallos fértiles (2)...

Praderas húmedas, lugares turbosos, bordes de cursos de agua, sitios húmedos de brezales y claros de bosque; tanto en substrato silíceo como en su...

Euroasiática; gran parte de Europa, el Cáucaso, Anatolia y W de Siberia, NW de África, Azores, Madeira; ¿como asilvestrada, en el N de América? Dispe...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-erecta.html>

### *Merdigera obscura* (Müller, 1774)

Gasterópodo de 8.5-10.5 x 3-4 mm, con la concha parda, estriada de forma muy densa radialmente, con 6 vueltas de espira ligeramente convexas, con la s...

Vive en zonas rocosas y umbrosas en bosques caducifolios, en los troncos de los árboles y bajo las hojas caídas, pero también fuera de bosques, bajo p...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/merdigera-obscura.html>

### *Euphorbia hirsuta* L.

Planta perenne, multicaule, de ordinario notablemente pelosa -pelos blanquecinos, patentes y hasta de 1 mm-, por excepción glabrescente o glabra. Tall...

Herbazales subnitrófilos y húmedos de márgenes de ríos, arroyos, acequias, lagunas y marismas; 0-700(1300)....



Circunmediterránea; introducida en Méjico, Canarias y Sudáfrica. Difundida por casi toda la Península -excepto en el CW, más frecuente en el E y S- y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-hirsuta.html>

## *Ancylus fluviatilis* Müller, 1774

Pequeño gasterópodo de 3.5-8 x 2-3.5 mm, con la concha de color de amarillento claro a pardo rojizo, fino, translúcido, con una escultura reticulada, ...

Vive sobre y bajo piedras y hojas de plantas en aguas de curso rápido claras y ricas en oxígeno, desde pequeños torrentes a ríos y también en la orill...

Norte de África, casi Europa entera (excepto la parte central y el N de Escandinavia) y SO de Asia...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ancylus-fluviatilis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Tubulicrinis inornatus* (H.S. Jacks. & D.P. Rogers) Donk (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 06/03/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tubulicrinis-inornatus-h-s-jacks-d-p-rogers-donk-1/24334.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Phaonia angelicae* (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

### *Salix matsudana* Koidz. (Magnoliophyta)

### *Tubulicrinis inornatus* (H.S. Jacks. & D.P. Rogers) Donk (Basidiomycota)

