



Num. 581. Publicado el 16/05/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Doto pinnatifida*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 581. Publicado el 16/05/2016

Descripciones de especies

Spergularia marina (L.) Besser

Planta herbácea anual, bienal o perenne de corta vida, de cepa delgada o ligeramente leñosa, totalmente glabra o glanduloso-pubescente en la infloresc...

Arenales costeros, terrenos alterados junto al mar, marismas y zonas salinas del interior; 0-1200 m....

Subcosmopolita. Baleares, costas y zonas interiores endorreicas del C, E y S de la Península Ibérica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-marina.html>

Limonium insigne (Coss.) Kuntze

Planta perenne, pluricaule, glabra, con una cepa de 1-6 cm. Hojas de la roseta 30-90 x 7-22 mm, marchitas y generalmente ya desprendidas en la antesis;...

Acantilados costeros, estepas litorales y taludes secos del interior; 0-400 m....

Planta endémica del SE de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limonium-insigne.html>

Doto pinnatifida (Montagu, 1804)

Doto pinnatifida es una de las mayores especies del género, ya que llega a alcanzar los 29 mm de longitud. Tiene un cuerpo de color pálido, con un mot...

Vive y se alimenta del hidrozoo *Nemertesia antennina* en el sublitoral de zonas de aguas calmadas....

Desde el sur de Noruega al sur de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doto-pinnatifida.html>

Centaurea seridis L.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares u...

Herbazales de borde de camino, lechos de río, etc., en suelos más o menos nitrificados; 0-1300 m....

S de Europa -España, Baleares (dudoso), Italia, Sicilia, Albania y Grecia- y NW de África -Marruecos, Argelia y Túnez-. E y S de España....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-seridis.html>

Calepina irregularis (Asso) Thell.

Planta herbácea con tallo de hasta 80 cm. Hojas con el ápice siempre obtuso; las basales 4-12 x 1-4 cm, arrosetadas, más o menos persistentes, obovadas...

Lugares pedregosos y herbazales subnitrófilos, espinares y lugares algo sombreados y húmedos en la orla de bosques caducifolios; 500-1600 m....

C y S de Europa, N de Africa y SW de Asia. Dispersa por la Península, parece faltar en el extremo SE....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calepina-irregularis.html>

Novedades corológicas

Apiospora montagnei Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. O el día 12/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/apiospora-montagnei-sacc-1/24983.html>

Munkovalsaria donacina (Niessl) Aptroot (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. O el día 13/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/munkovalsaria-donacina-niessl-aptroot-1/24995.html>

Pirottaea caesiella (Bres.) Nannf. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 15/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pirottaea-caesiella-bres-nannf-1/25012.html>

Tapesina griseovitellina (Fuckel) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Liérvado, Gijón. O el día 13/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25004.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Apiospora montagnei Sacc. (Ascomycota)

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)



Brassica rapa L. (Magnoliophyta)

Centaurea seridis L. (Magnoliophyta)

Doto pinnatifida (Montagu, 1804) (Mollusca)

Limonium insigne (Coss.) Kuntze (Magnoliophyta)

Munkovalsaria donacina (Niessl) Aptroot (Ascomycota)

Pirottaea caesiella (Bres.) Nannf. (Ascomycota)

Psilachnum pteridigenum Graddon (Ascomycota)

Scaurus punctatus Fabricius, 1798 (Arthropoda)

Tapesina griseovitellina (Fuckel) Höhn. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887506008