



Num. 587. Publicado el 27/06/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pawsonia saxicola*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 587. Publicado el 27/06/2016

Descripciones de especies

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort.

Hepática que forma céspedes altos que alcanzan incluso varios metros cuadrados de extensión, con caulidios de color verde, luego pardos, de hasta 1 cm...

Crece en lugares sombreados, en suelos frescos y ricos en nutrientes, humíferos, generalmente acompañada de *Thuidium tamariscinum* y *Eurhynchium striat...*

Es común en las zonas frescas de Eurasia, estando en zonas sureñas restringidas a zonas montañosas...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plagiochila-asplenioides>

Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953)

Nudibranquio de hasta 30 mm de longitud, con el manto esencialmente negro con marcas y líneas amarillas y zonas de color azul brillante. El borde del ...

Intermareal....

Atlántico norte, norte de África y el Mediterráneo...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/felimare-bilineata>

Colutea arborescens L.

Arbusto o árbol pequeño de 2-3(5) m, de corteza persistente; indumento formado por pelos de hasta 0,4-0,7 mm, adpresos, rara vez erecto-patentes en l...

Carrascales, quejigares y hayedos, sobre substrato calcáreo; 300-1150 m. ...

S y C de Europa. NE de España...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colutea-arborescens>

Centaurea pullata L.

Hierba anual, o perenne y entonces con raíz axonomorfa engrosada, napiforme, o con raíces fasciculadas tuberizadas, inermes, verde, con pelos tectores...

Herbazales nitrófilos de bordes de camino y carretera, preferentemente en substratos calcáreos; 0-1500 m. ...

SO de Europa -Portugal, España y Francia- y NW de África; naturalizada o adventicia en algunos países del S de Europa y el N de África. Mitad S



de la ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-pullata>

Aristolochia baetica L.

Planta trepadora provista de un rizoma globoso-fusiforme del que surgen tallos sufruticulosos, con ramillas débiles, a veces filiformes, angulosas. Hoj...

Matorrales, bosques, setos y espinares, a veces en zonas rocosas; piso basal....

Sur de la Península Ibérica y N de África. Andalucía, Levante y el Algarve. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-baetica>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arenicolides branchialis (Audouin & Milne Edwards, 1833) (Annelida)

Carduncellus monspelliensium All. (Tracheophyta)

Cerintho gymnandra Gasp. (Tracheophyta)

Colutea arborescens L. (Tracheophyta)

Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo (Basidiomycota)

Cynara humilis L. (Tracheophyta)

Delphinium nanum DC. (Tracheophyta)

Emex spinosa (L.) Campd. (Tracheophyta)

Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk (Basidiomycota)

Gluvia dorsalis (Latreille, 1817) (Arthropoda)

Hemimycena mauretana (Maire) Singer (Basidiomycota)

Heterosphaeria alpestris (Fr.) Höhn. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



Leptosphaeria bellynckii (Westend.) G. Winter (Ascomycota)

Retama monosperma (L.) Boiss. (Tracheophyta)

