



## Num. 589. Publicado el 11/07/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Chalcis myrifex*. Por Mikel Tapia Arriada



**Num. 589. Publicado el 11/07/2016**

## Descripciones de especies

### *Trifolium stellatum* L.

Hierba anual, pelosa. Tallos (4)10-40 cm, erectos o ascendentes, con pelospatentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas, dentad...

Herbazales y pastos pobres, eutrofizados, ruderales; 0-1500 m....

SE de Gran Bretaña, S de Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Madeira y Canarias). Principalmente en la mitad S de la Península, I...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-stellatum.html>

### *Retama monosperma* (L.) Boiss.

Arbusto o árbol pequeño de (1,5)2-3 m. Ramas redondeadas, con (11)13(14)costillas longitudinales en forma de T, seríceo-plateadas cuando jóvenes, má...

Sabinares, enebrales y pinares de las dunas móviles o semifijas costeras; 0-300 m....

Península Ibérica y NW de Marruecos. SW de la Península Ibérica (desde Setúbal hasta Gibraltar); naturalizada en diversos puntos de la Península E...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/retama-monosperma.html>

### *Klasea pinnatifida* (Cav.) Cass.

Hierba perenne, rizomatosa, de un verde oscuro, con pelos unicelulares araneo -sos. Tallos hasta de 55 cm, erectos, simples, muy raras veces ramifi...

Bosques y matorrales calcícolas mediterráneos, preferentemente esclerófilos, linderos de bosque, lastonares, tomillares y matorrales, etc.; 30-2200 m...

Península Ibérica y NW de África -Argelia y Túnez-. Abundante en la mitad oriental de la Península y dispersa en la mitad occidental...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/klasea-pinnatifida.html>

### *Centaurium grandiflorum* (Pers.) Ronniger

Hierba anual o bienal, erecta, glabra o algo escábrida, con rizoma verticalcorto y grueso, a veces bifurcado, que produce una o varias rosetas basal...

Pastizales en zonas abiertas o en claros de bosque y matorral, laderas, taludes, ribazos, en substratosácidos o básicos, a veces arenosos; 0-1500 m....



SO de Europa y NW de África. Casi toda la Península, siendo más rara en el SE...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-grandiflorum.html>

## *Asphodelus macrocarpus* Parl.

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, bien desarrollado, con algunos restos fibrosos de las hojas viejas más o menos gruesos o sin ell...

Pastizales montanos, sotobosques, claros de bosque -melojares, encinares, alcornoques, castaños, pinares- y matorrales, en suelos de cierta profun...

S de Europa -Península Ibérica, Francia e Italia- y NW de África -Marruecos-. Preferentemente en el C y W de la Península Ibérica, más rara en el NE...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-macrocarpus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Galerina sahléri* (Quél.) Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. O el día 10/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25643.html>

### *Pezicula frangulae* (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. O el día 10/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pezicula-frangulae-pers-fuckel-1/25647.html>

### *Therrya pini* (Alb. & Schwein.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 05/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25606.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Chalcis myrifex* (Sulzer, 1776) (Arthropoda)

### *Conocybe brunneidisca* (Murrill) Hauskn. (Basidiomycota)

### *Galerina sahléri* (Quél.) Kühner (Basidiomycota)



*Klasea pinnatifida* (Cav.) Cass. (Magnoliophyta)

*Pezicula frangulae* (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

*Therrya pini* (Alb. & Schwein.) Höhn. (Ascomycota)

