



Num. 596. Publicado el 29/08/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Asparagus acutifolius*. Por José Luis Porto Torres



Num. 596. Publicado el 29/08/2016

Descripciones de especies

Phlomis purpurea L.

Arbusto de 50-80(150) cm, con tallos lanudos, grisáceos, a veces amarillentos, erectos, muy foliosos abajo, cubiertos de pelos estrellados. Hojas de 4...

Matorrales xerófilos en roquedos y lugares pedregosos en todo tipo de sustrato, preferentemente calizo; 20-1000 m....

Península Ibérica y NW de África. Tercio S y E de la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-purpurea.html>

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)

Pequeña mariposa de 17-29 mm de envergadura alar, muy coloreada, con las alas anteriores de color rosa y amarillo, en ocasiones mostrando una banda bl...

Vuela en junio y julio principalmente y es atraída por los focos de luz durante la noche. La larva se alimenta de Lotus y Trifolium y durante la pupac...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oncocera-semirubella.html>

Mentha cervina L.

Hierba 10-42 cm, con estolones reptantes, a veces muy largos, los acuáticos que nacen de los tallos leñosos o de las raíces, de 0,5-0,6 mm de diámetr...

Bordes de zonas encharcadas, a veces temporalmente, preferentemente en lugares arenosos o con gravas, en general silíceos, a veces arcillosos o caliz...

Sur de Francia, Península Ibérica y N de África. Dispersa por la Península Ibérica, más frecuente hacia el centro....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mentha-cervina.html>

Hibiscus palustris L.

Hierba perenne con un tallo de hasta 1,20(2) m, pubescente en la parte inferior, glabrescente en la superior. Hojas de 8-15 x 4-10 cm, de ovado-lanceo...

Terrenos bajos y encharcados, cañaverales, etc.; 5-10 m. ...

Región fría y templada de Europa, Asia y América del Norte. Muy localizada en Cantabria y Beira Litoral...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hibiscus-palustris.html>

Carex divisa Huds.

Rizoma de entrenudos muy largos, cubierto por escamas, enteras o algo fibrosas. Tallos de (8)15-50(70) cm, trígono con los ángulos agudos u obtusos, ...

Indiferente edáfica, coloniza las cunetas, prados primaverales, suelos arenosos y salinos; 0-1500 m....

Región mediterránea. En la Península Ibérica crece abundante en las regiones de clima mediterráneo, falta por tanto de algunas provincias de la Corni...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-divisa.html>

Novedades corológicas

Geastrum elegans Vittad. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Cobertoria, Lena, Asturias. O el día 26/08/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/geastrum-elegans-vittad-1/26087.html>

Psilocybe semistriata (Peck) Guzmán (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. O el día 23/08/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//26052.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asparagus acutifolius L. (Magnoliophyta)

Baldellia repens subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera (Magnoliophyta)

Cryphia muralis Forster, 1771 (Arthropoda)

Geastrum elegans Vittad. (Basidiomycota)

Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl. (Basidiomycota)

Mentha cervina L. (Magnoliophyta)



Oenanthe fistulosa L. (Magnoliophyta)

Psilocybe semistriata (Peck) Guzmán (Basidiomycota)

Resinomyces saccharifera (Berk. & Broome) Redhead (Basidiomycota)

Steropleurus andalusius (Rambur, 1838) (Arthropoda)

