



Num. 600. Publicado el 26/09/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Spurilla neapolitana*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 600. Publicado el 26/09/2016

Descripciones de especies

Lotus creticus L.

Hierba perenne, densamente serícea. Tallos hasta de 150 cm, decumbentes o ascendentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja ...

Pastizales y matorrales de dunas y arenales costeros; 0-50 m....

Península Ibérica, SE de Francia, Italia, Sicilia, islas orientales del Egeo, Oriente Próximo, N de África y Macaronesia (Azores y Canarias). Costas...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lotus-creticus>

Iberus alonensis (Férussac, 1831)

Gasterópodo terrestre con un tamaño máximo de unos 4 cm de diámetro por 2,5 de altura, con una concha globosa, fuerte, de color blanquecino, crema o m...

Vive en zonas calizas donde se suele refugiar bajo piedras, en grietas y en la base o interior de plantas y arbustos....

Especie endémica de la mitad este de la Península Ibérica, excepto Andalucía y el sur de Murcia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iberus-alonensis>

Chlaenius festivus (Panzer, 1796)

Coleóptero con un tamaño de 13 a 16 mm. Su parte dorsal tiene una coloración verde metálica, con el pronoto totalmente verde o bronceado, sin margen a...

Especie ripícola, que viven en los márgenes de cursos de agua, zonas encharcadas,.....

Coleóptero nativo del Paleártico y Oriente Próximo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chlaenius-festivus>

Centaurea polyacantha Willd.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares ...

Herbazales litorales o de interior, en suelos arenosos y dunas fijas más o menos nitrificados; 0-150 m....

Península Ibérica y NW de Marruecos. W y SW de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-polyacantha>



Baetica ustulata (Rambur, 1838)

Ortóptero de tamaño mediano, 18-22 mm los machos y 22-26 mm las hembras, las cuales tienen un ovopositor curvado de 16 a 17 mm, dos veces la longitud...

Baetica ustulata aparece en la zona silíceo desierra Nevada, por encima de los 2000 metros de altitud y ligada a ambientes xerófilos y psicroxerófilos...

La distribución de *Baetica ustulata* está exclusivamente restringida al macizo de sierra Nevada, en los pisos oromediterráneo y crioromediterráneo, en ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/baetica-ustulata>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amphictene auricoma (O.F. Müller, 1776) (Annelida)

Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790) (Arthropoda)

Chlaenius festivus (Panzer, 1796) (Arthropoda)

Crataegus laevigata (Poir.) DC. (Tracheophyta)

Elysia timida (Risso, 1818) (Mollusca)

Erysiphe depressa (Wallr.) Link (Ascomycota)

Exhylanthrax afer (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

Hymenoscyphus rokebyensis (Svrcek) Matheis (Ascomycota)

Lepiota cristatoides Einhell. (Basidiomycota)

Leptosphaeria doliolum (Fr.) De Not. (Ascomycota)

Lindgomyces griseosporus Ying Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde (Ascomycota)

Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple (Basidiomycota)

Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple (Basidiomycota)



Phaneroptera nana Fieber, 1853 (Arthropoda)

Pholiotina sulcata Arnolds & Hauskn. (Basidiomycota)

Pholiotina teneroides (J.E. Lange) Singer (Basidiomycota)

Polistes bischoffi (Weyrauch, 1937) (Arthropoda)

Psathyrella pseudogracilis (Romagn.) M.M. Moser (Basidiomycota)

