



Num. 605. Publicado el 31/10/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cortinarius vulpinus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 605. Publicado el 31/10/2016

Descripciones de especies

Thymus mastigophorus Lacaita

Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, radicante. Tallos vegetativos menores o iguales a 50 cm, tendidos, generalmente rojizos, pubescentes, densamente p...

Tomillares o matorrales poco densos, en substratos básicos, calizas, margas y margas yesíferas; 500-1300 m....

Endemismo de España. Meseta N, valle alto del Ebro y N de Guadalajara. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymus-mastigophorus>

Rumex intermedius DC.

Planta generalmente papilosa, especialmente en los pecíolos y nervios de las hojas, de hasta 75(90) cm. Cepa muy gruesa, leñosa, tortuosa. Tallos erectos...

Ribazos, laderas secas, matorrales, encinares aclarados, barbechos, viñedos, al pie de roquedos. etc., a veces en arenales marítimos; en substrato calizo...

Centro y oeste de la región mediterránea europea; Marruecos? Ampliamente repartida por la Península y Baleares, aunque falta de las zonas de clima atlántico...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-intermedius>

Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846)

Holoturia de cuerpo alargado, de hasta 15 cm de longitud y 1 de grosor, de color pardo oscuro, que se estrecha en los extremos, normalmente doblado hacia...

Vive en substratos fangosos donde vive enterrada mostrando tan solo los extremos del cuerpo, entre los 0 y 65 m de profundidad. Se ha observado que est...

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leptopentacta-elongata>

Clavaria asterospora Pat.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos gregarios, blancos, simples, no ramificados, fusiformes y lanceolados de hasta 20 x 2 mm, soportados por un pedículo ...



Generalmente en suelo, sobre humus de Rubus...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clavaria-asterospora>

Centaurea solstitialis L.

Hierba anual, con raíz axonomorfa, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde-grisácea, con pelos tectores pluricelulares uniseriados y pelos ...

Herbazales en el margen de caminos y carreteras, baldíos y campos, en suelos más o menos nitrificados, preferentemente en substratos calcáreos; 0-120...

SO de Asia, Europa y Región Mediterránea; introducida en otras partes del mundo y actualmente subcosmopolita. Dispersa por el C, E y S de España. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-solstitialis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Clitocybe nitrophila Bon (Basidiomycota)

Cortinarius nanceiensis Maire (Basidiomycota)

Cortinarius vulpinus (Velen.) Rob. (Basidiomycota)

Eutrombidium rostratus (Scop, 1763) (Arthropoda)

Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome (Basidiomycota)

Incrucipulum virtembergense (Matheis) Baral (Ascomycota)

Lagerstroemia indica L. (Tracheophyta)

Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846) (Echinodermata)

Psathyrella langei (Malençon) Contu (Basidiomycota)

Psathyrella phegophila Romagn. in Kits van Wav. (Basidiomycota)

Rissa tridactyla Stephens, 1826 (Chordata)

ISSN 1887-5068



Rumex intermedius DC. (Tracheophyta)

Thymus mastigophorus Lacaita (Tracheophyta)

Tricholoma sulphurescens Bres. (Basidiomycota)

