



Num. 611. Publicado el 12/12/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dermoloma josserandii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 611. Publicado el 12/12/2016

Descripciones de especies

Trifolium resupinatum L.

Hierba anual, glabra, glandulosa. Tallos 7-55 cm, erectos o ascendentes, macizoso fistulosos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovad...

Pastos, en depresiones inundables, eutrofizadas, hasta subsalinas; 0-1500 m. Tolera bien las heladas intensas aunque se desarrolla muy lentamente a ba...

Centro y sur de Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Baleares y casi toda la Península excepto el SE...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-resupinatum>

Thymus pulegioides L.

Sufrútice 6-30 cm, de aspecto herbáceo, generalmente con renuevos rastreros, radicales. Tallos largos, decumbentes, con frecuencia desordenados, a v...

Prados más o menos húmedos, matorrales o claros de bosque, indiferente edáfica; 50-2500(2620) m....

Toda Europa, más rara hacia el S. Mitad N de la Península Ibérica y Sierra Nevada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymus-pulegioides>

Rumex obtusifolius L.

Planta perenne, de hasta 1,5 m. Tallos erectos, estriado-asurcados, a veces teñidos de pardo o púrpura. Hojas basales (70)90-270(300) x (55)60-140(160)...

Prados húmedos, sotos, fuentes y bordes de cursos de agua, en medios más o menos alterados; 200-1700 m....

Europa, W de Asia y naturalizada en otras partes del Globo. Mitad N de la Península, más rara en el S: Sierra Nevada, Serra de Monchique, etc....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-obtusifolius>

Nebria salina Fairmaire et Laboulbene, 1854

Nebria salina es un carábido con una longitud entre 10 y 14 mm. La cabeza y élitros son de color negro-marrón; el pronoto es ligeramente más oscuro. Ti...

Se trata de una especie xerófila que crece en zonas abiertas en suelos bien drenados en turberas o montañas. La quema y el pastoreo, u otro manejo



que...

Se trata de un escarabajo que aparece en regiones templadas suboceánicas, más frecuente en la parte oeste de Europa, pero extendiéndose localmente al ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nebria-salina>

Erodium malacoides (L.) LHér.

Hierba 3,5-60 cm, anual, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallos ascendentes, con pelos glandulíferos, a veces no glandulíferos más...

Bordes de camino, cultivos, dunas más o menos alteradas, pastos pedregosos, en suelos más o menos nitrificados o alterados; 0-1500 m....

Desde el SW de Asia, por toda la Región Mediterránea y Macaronesia, hasta el W de Europa -llega hasta las costas inglesas-, naturalizado en Sudáfrica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-malacoides>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Calathus mollis (Marsham, 1802) (Arthropoda)

Camarophyllopsis hymenocephala (A.H. Sm. & Hesler) Arnolds (Basidiomycota)

Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Colpa quinquecincta (Fabricius 1793) (Arthropoda)

Dasyogon gougeleti (Bigot, 1878) (Arthropoda)

Dermoloma josserandii Dennis & P.D. Orton (Basidiomycota)

Epibryon muscicola (Racov.) Döbbeler (Ascomycota)

Lepiota griseovirens Maire (Basidiomycota)

Meliscaeva auricollis Meigen, 1822 (Arthropoda)



Nebria salina Fairmaire et Laboulbene, 1854 (Arthropoda)

Panaeolus acuminatus Qué. (Basidiomycota)

Panaphis juglandis (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Pistacia saportae Burnat (Tracheophyta)

Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008