



Num. 693. Publicado el 09/07/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gnathia oxyuraea*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 693. Publicado el 09/07/2018

Descripciones de especies

Thymus praecox Opiz

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente, más o menos radicante, con estolones estériles, con aspecto herbáceo. Tallos menores o iguales a 45 cm; tallos ...

Bordes de bosque, pastos alpinos, indiferente edáfica; 10-2500 m....

Europa occidental y central. Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymus-praecox.html>

Perinereis cultrifera (Grube, 1840)

Anélido poliqueto de 30-100 mm de longitud, de cuerpo alargado, con sección transversal plano convexa y aguda en la parte posterior; la anchura es de ...

Aparece tanto sustratos blandos como duros y soporta variaciones de salinidad. En ocasiones aparece en charcas supralitorales....

Presente en las aguas templadas y tropicales del Atlántico oriental, desde el Mar de Norte a Sudáfrica, Indopacífico y Pacífico. ...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/perinereis-cultrifera.html>

Lythrum hyssopifolia L.

Planta anual, de (17)25-40(60) cm, ramificada desde la base. Tallo erecto, aveces prostrado, de sección cuadrangular (con los ángulos poco marcados),...

Arenas húmedas y bordes de charcas o lagunas estacionales; 0-1200 m....

Cosmopolita. Por toda la Península, aunque más frecuente en el cuadrante SW. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lythrum-hyssopifolia.html>

Lysidice collaris Grube, 1870

Anélido poliqueto de unos 3,5 centímetros para un número de segmentos setíferos tras el prostomio de entre 130 y 140; coloración general pardo rojiza ...

Infralitoral....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lysidice-collaris.html>

Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792)

Decápodo con un caparazón casi circular de 28-39 mm de longitud, casi tan ancho como largo, de color pardo rojizo con los quelípedos y pereiópodos de ...

Vive entre los 12 y 91 m de profundidad, tanto en sustratos de grava como de arena. Presenta hembras ovígeras desde febrero a septiembre....

Costa oeste de Europa y África, así como casi todo el mar Mediterráneo y en Cabo Verde y las islas Canarias....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/atelecyclus-rotundatus.html>

Novedades corológicas

Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev. (Magnoliophyta)

Novedad para la flora de Cantabria. Posiblemente introducida por alguna maquinaria de laboreo o por su cercanía a la autopista. Hecho ocurrido también en otras provincias como Huesca (Flora Montiberica, 53: 99) o Madrid. Son localidades alejadas de su área natural, que correspondería a los pastos sobre yesos de la depresión de Ebro. - Citado por Juan Luis Menéndez en SAN ANDRES (VALDEPRADO), Cercanías de San Andrés, junto a la autopista A-67, Valdeprado del Río. S el día 04/07/2018

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/flora/agropyron-cristatum-subsp-pectinatum-1/31473.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. (Magnoliophyta)

Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev. (Magnoliophyta)

Eilema lurideola (Zincken, 1817) (Arthropoda)

Gnathia oxyuraea (Lilljeborg, 1855) (Arthropoda)

Hoplia chlorophana Erichson, 1848 (Arthropoda)

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)



Synthymia fixa (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Syzygites megalocarpus Ehrenb. (Zygomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008