



## Num. 711. Publicado el 12/11/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Aythya collaris*. Por César Fernández González



Num. 711. Publicado el 12/11/2018

## Descripciones de especies

### *Paspalum distichum* L.

Planta herbácea de hasta 70 cm con estolones largos. Hojas basales con vaina ciliada; lámina hasta 11 cm x 6-9 mm; lígula 1-2 mm. Panícula con 2(3) ...

Vegetación ruderal y arvense, en lugares húmedos y cultivos en regadío, 0-700 m....

Subcosmopolita, introducida, oriunda del Neotrópico. Muy dispersa en gran parte del territorio....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/paspalum-distichum>

### *Lumbricus terrestris* Linnaeus, 1758

*Lumbricus terrestris* es la lombriz de tierra por excelencia en Europa. Tiene un cuerpo segmentado de color marrón rosado, de 10-25 cm de longitud y s...

La lombriz de tierra vive en el suelo, alimentándose de materia orgánica que engulle mezclada con tierra. Su actividad favorece la estructura y poro...

Se cree que la lombriz de tierra es nativa de Europa occidental, pero ahora se distribuye globalmente en climas boreales de templado a suave. En muchas...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lumbricus-terrestris>

### *Larus michahellis* Naumann, 1840

Gaviota de 55-67 cm de longitud y 130-158 cm de envergadura. Es muy parecida a la gaviota argétea (*Larus argentatus*), de la que se consideraba una s...

La gaviota patiamarilla es muy adaptable a la hora de escoger hábitat. En época de cría prefiere acantilados e islas cercanas a la costa, pero por ...

*Larus michahellis* se distribuye ampliamente por las regiones meridionales del Paleártico, desde el oeste del mar Negro hasta la cuenca del Mediterrá...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/larus-michahellis>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Ephippigerida areolaria* (Bolívar, 1877)

Saltamontes de coloración general amarillenta o parduzca y con una longitud del cuerpo de 18-22 mm; pronoto de 4-4,5mm; fémures posteriores de 15 mm...

Pastizales de montaña...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ephippigerida-areolaria>

## *Bromus catharticus* Vahl

Planta herbácea de 15-100(150) cm. Tallos glabros. Hojas subglabras o pubérulas, las inferiores más pelosas; lámina 15-35 x 0,4-1 cm, plana, escáb...

Arvense y ruderal, en suelos húmedos de zonas litorales, 0-200 m....

Originaria de Sudamérica, cultivada como forrajera y naturalizada en gran parte del Globo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/bromus-catharticus>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Aythya collaris* (Donovan, 1809) (Chordata)

*Ephippigerida areolaria* (Bolívar, 1877) (Arthropoda)

*Lactarius pubescens* (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

*Lepista personata* (Fr.) Cooke (Basidiomycota)

