



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 718. Publicado el 31/12/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Leiobunum defectivum*. Por Izaskun Merino Sainz



Num. 718. Publicado el 31/12/2018

## Descripciones de especies

### *Orthilia secunda* (L.) House

Planta con un tallo de 7-25 cm, folioso en su mitad inferior y provisto en la otra mitad de escamas lanceoladas, más o menos persistentes. Hojas de li...

Bosques húmedos, sobre todo de pinos y abetos, saprófito parcial en el mantillo; 900-2100....

Europa, Asia y N de América. Pirineos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/orthilia-secunda>

### *Leiobunum defectivum* Rambla, 1959

Los leiobúnidos son los opiliones más abundantes y conocidos gracias a las extraordinariamente largas (hasta 72 mm) y delgadas patas engarzadas en u...

En la Sierra de Guadarrama, Rambla (1959) realiza un estudio en el que halla 75 individuos (49 hembras, 22 machos y 4 juveniles) de *Leiobunum biseriati*...

*Leiobunum defectivum* es un endemismo ibérico extendido por toda la Meseta del Duero y los relieves circundantes (aunque parece estar ausente en la Co...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & CABANILLAS ROLDÁN, David

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/leiobunum-defectivum>

### *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman

Helecho con un rizoma con páleas de color castaño del que surgen frondes de (10)15-35(40) cm; pecíolo 2/3-4/5 de la longitud de la fronde; lámina ...

Bosques umbrosos y húmedos, con el rizoma bajo el mantillo y en grietas de roquedos o pedregales silíceos; 850-2500 m....

Reino holártico. Sistema pirenaico-cantábrico y sistemas Ibérico y Central, donde es más raro. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gymnocarpium-dryopteris>

### *Conyza canadensis* (L.) Cronquist.





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Planta de (3-)50-200(-350) cm, erecta, ramificada generalmente en el extremo. Hojas con las caras normalmente glabras; en los márgenes más o menos ciliadas...

Ruderal y viaria, 0-1100 m...

Naturalizada, oriunda de América del Norte. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/conyza-canadensis>

## *Asarina procumbens* Mill.

Hierba perenne, de 7-45(60) cm, con denso indumento formado por pelos glandulíferos pluricelulares, uniseriados, rectos, patentes, de 0,4-0,6 mm. Tallos...

Coloniza fisuras de rocas preferentemente silíceas, en media y alta montaña, aunque ocasionalmente desciende a zonas bajas más térmicas; (400)700-...

Sierras catalanas prepirenaicas, Pirineos orientales y centrales por ambas vertientes, y Macizo Central francés; al parecer naturalizada en las Islas...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/asarina-procumbens>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Cardamine resedifolia* L. (Chloroplastida)

*Galium maritimum* L. (Chloroplastida)

*Leiobunum defectivum* Rambla, 1959 (Arthropoda)

*Paramiopsalis ramulosus* Juberthie, 1962 (Arthropoda)

*Themisto gaudichaudii* Guérin, 1825 (Arthropoda)

*Verbascum boerhaviae* L. (Chloroplastida)

