



Num. 720. Publicado el 14/01/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rhodiola rosea*. Por César Fernández González



Num. 720. Publicado el 14/01/2019

Descripciones de especies

Vicia incana Gouan

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alargados, trepadora o no, densamente vilosa, con pelos de 0,5-1 mm, erectos, blan...

Ribazos, bordes de caminos, pastos húmedos, brezales y claros de otras formaciones leñosas; 0-1800 m. ...

Centro y S de Europa y Asia Menor. N y E de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-incana.html>

Pinguicula vulgaris L.

Hierba perenne, con aparato radical exiguo, que hiberna bajo la forma de yema, sin estolones. Hojas 5-9, horizontales, aplicadas al substrato, peciolad...

Bordes de riachuelos y arroyos, turberas, prados y terrenos húmedos, en las montañas, indiferente edáfica; (1000)1400-2600 m....

Norte de América, Europa, O y C de Asia y NO de África (Marruecos). Dispersa en el tercio septentrional de la Península Ibérica, desde la Serra do Ger...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pinguicula-vulgaris.html>

Iberosiro rosae Giribet, Merino-Sainz & Benavides, 2017

Cyphophthalmi Simon, 1879 constituye el más pequeño de los cuatro subórdenes de Opiliones (siendo los otros tres: Eupnoi, Dyspnoi y Laniatores), compu...

Los Cifoftalmos son habitantes del suelo y no migran a estratos superiores de la vegetación. Viven enterrados entre la hojarasca, el humus y la tierra...

Cada una de las familias tiene una distribución geográfica bien caracterizada. Los Sironidae están sólo en Laurasia en zonas templadas del hemisferio ...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iberosiro-rosae.html>

Corynis obscura (Fabricius, 1775)

Cimbécido con un tamaño de 8 a 15 mm de coloración casi negra y con el margen de las alas y los tarsos, testáceos. Antenas filiformes formadas por 7 a...



Se la suele encontrar en lugares cálidos con presencia abundante de *Geranium sanguineum* o *Geranium sylvaticum*, aunque también se alimenta de otras pla...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corynis-obscura.html>

Cardamine resedifolia L.

Hierba vivaz, subcespitosa, a menudo multicaule, glabra, con un tallo de 3-10(22) cm, delgado, en general erecto. Hojas basales en roseta que en genera...

Roquedos, pedregales y a veces pastos, principalmente en alta montaña silíceas; (1300)1700-3300 m....

Montañas del C y S de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sierra Nevada y tal vez en algún otro macizo, de donde se conoce material dudoso....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-resedifolia.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Pilosella lactucella (Wallr.) Sell & West (Magnoliophyta)

Pinguicula vulgaris L. (Magnoliophyta)

Polygonum alpinum All. (Magnoliophyta)

Rhodiola rosea L. (Magnoliophyta)

Silene latifolia Poir. (Magnoliophyta)

Silene vulgaris (Moench) Garcke (Magnoliophyta)

Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill (Magnoliophyta)

