



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 728. Publicado el 11/03/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cyanopica cooki*. Por César Fernández González



Num. 728. Publicado el 11/03/2019

## Descripciones de especies

### *Onopordum illyricum subsp. illyricum* L.

Planta herbácea bienal, por lo general multicaule, espinosa, verde-grisácea, blanquecina o blanco-grisácea, rara vez verde, con indumento denso de ...

Bordes de camino, laderas pedregosas, claros de matorral xerófilo, por lo general en sustratos calizos o yesos, nitrófila; (0)500-1300 m....

Sur de Europa occidental; naturalizada en Australia. Dispersa por el N de Portugal, C, CW, E y S de España y Baleares. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/onopordum-illyricum-subsp-illyricum>

### *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.

Liquen folioso de talo muy grande, llegando a sobrepasar los 35 cm de diámetro, con una parte más o menos adherida al sustrato y otras en franjas bi...

En territorios con precipitaciones abundantes y en enclaves poco heliófitos; epífitas en troncos y ramas de árboles y arbustos o sobre rocas musgos...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lobaria-pulmonaria>

### *Festuca elegans* Boiss.

Planta herbácea cespitosa de 50-90 cm, con renuevos intravaginales, vernación conduplicada. Hojas de los renuevos plegadas; vaina abierta, escabriús...

Pastos vivaces (lastonares), fisuras de roquedos, en sustratos silíceos (esquistos) y calizos descarbonatados (calizas, dolomías), 900-1800 m....

Íbero-magrebí....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/festuca-elegans>

### *Cyanopica cooki* Bonaparte, 1850

El rabilarco es un ave de 34-35 cm de longitud y 38-40 cm de envergadura, con una silueta muy parecida a una urraca (*Pica pica*). Presenta una cola lar...

*Cyanopica cooki* vive principalmente en masas forestales no muy densas, precisando siempre de áreas de suelo libre de matorral en donde poder





asturnatura

alimenta...

# Revista asturnatura.com

La distribución mundial de este córvido es curiosa, ya que presenta dos poblaciones separadas por millares de kilómetros. Una de ellas -la más ext...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cyanopica-cooki>

## *Amsinckia calycina* (Moris) Chater

Planta herbácea de hasta de 60 cm, setoso-hispida, unicaule. Tallos erectos, ramificados en la parte superior, hispídos, con pelos patentes de dist...

Ruderal y arvense; 650-1500 m....

De origen sudamericano, se encuentra naturalizada en el SO de Europa -Francia y España- y en Australia. C de España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/amsinckia-calycina>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Festuca elegans* Boiss. (Chloroplastida)

*Halimium calycinum* (L.) K. Koch (Chloroplastida)

*Onopordum illyricum subsp. illyricum* L. (Chloroplastida)

*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

