



Num. 729. Publicado el 18/03/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Viola riviniana*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 729. Publicado el 18/03/2019

Descripciones de especies

Paronychia argentea Lam.

Hierba perenne, algo leñosa en la base, ocasionalmente bienal. Tallos 3-50 cm, postrados, muy ramificados desde la base; entrenudos de hasta 3,5 cm, ...

Pastos en suelos arenosos o pedregosos, secos, márgenes de caminos, terrenos baldíos, etc., en medios más o menos ruderalizados; 0-1950 m...

Región mediterránea, Canarias. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares, falta en la zona cantábrica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/paronychia-argentea>

Lamarckia aurea (L.) Moench.

Hierba anual con tallos hasta de 52 cm, fasciculados, rara vez solitarios, geniculado-ascendentes, con entrenudos ahuecados, cilíndricos, ligeramen...

Pastos de terófitos en claros de sotobosque y matorral, roquedos, cultivos, baldíos, márgenes de caminos y carreteras, bordes de ríos y arroyos, e...

Región Mediterránea, C y SW de Asia, y Macaronesia (Madeira, Canarias); introducida y naturalizada en diferentes partes del mundo. Casi toda la Península...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lamarckia-aurea>

Halimium calycinum (L.) K. Koch

Sufrútice de hasta 60 cm de altura, muy ramoso, erecto o algo procumbente. Tallos con unas ramitas divaricadas y gráciles, otras cortas, tortuosas; ...

Matorrales y subvuelo de pinares, en suelo seco y arenoso, muy suelto, con preferencia en las dunas fijadas sublitorales; 0-650 m. Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/halimium-calycinum>

Cyperus capitatus Vand.

Planta herbácea, perenne; con rizomas que pueden alcanzar un tamaño de metros, subleñosos, con abundantes escamas pardas en las yemas. Tallos hasta...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Frecuente en playas y arenales costeros con arenas móviles; 0-30 m...

Litoral mediterráneo y subatlántico occidental. Toda la costa de la Península, excepto en el N, y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cyperus-capitatus>

Chamaesyce canescens subsp. canescens (L.) Prokh.

Planta anual, procumbente, pelosas, más raramente glabrescentes o glabras. Tallos de hasta 30 cm, ramificados radialmente desde la base hasta en 25 r...

Comunidades nitrófilas y ruderales de biótotos pisoteados, siempre sobre suelos húmedos más o menos compactos; 0-1000 m....

Región mediterránea y SO de Asia, introducida en Sudamérica. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica -escasea o falta en el cuadrante NO-...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-canescens-subsp-canescens>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cicada orni Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

