



Num. 732. Publicado el 08/04/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Meloe tucius*. Por José Rafael González López



Num. 732. Publicado el 08/04/2019

Descripciones de especies

Silybum eburneum Coss. & Durieu

Hierbas anuales o bienales, espinosas, verdosas, con pelos unicelulares araneosos y pelos pluricelulares uniseriados. Tallos hasta de 150(200) cm, ere...

Orilla de campos y caminos, baldíos, etc., en cardizales en suelos muy nitrificados; 100-750 m....

España y NO de África. Esporádica en el E de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silybum-eburneum>

Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792

Scarabaeus (Ateuchetus) semipunctatus, llamado comúnmente escarabajo pelotero de las dunas, es un escarabeido con un tamaño de 14-28 mm, de coloración...

Hace galerías en el suelo, de hasta 50 cm, donde la hembra deposita la bola de estiércol que transportó, y sobre ella pone los huevos, de esta forma c...

Especie relegada a los enclaves costeros y litorales del Mediterráneo occidental e insular (Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia). Se encuentra en la ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scarabaeus-semipunctatus>

Lathyrus clymenum L.

Planta herbácea anual o bienal, trepadora, glabra. Tallos hasta de 100 cm, ramificados en la base, alados; alas 0,4-2(3) mm de anchura. Hojas en genera...

Sotobosques, matorrales, herbazales al borde de cultivos, roquedos y taludes, sobre cualquier tipo de suelo; 0-1500 m....

Sur de Europa desde la Península Ibérica hasta la Península Balcánica, Asia Menor, N de África y Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira). Casi toda l...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-clymenum>

Gymnosporangium clavariiforme (Pers.) DC.

Hongo de tipo roya que presenta un ciclo vital formado por las siguientes fases: Espermogonios epífilos, inmersos, globosos en el centro de zonas d...



Los espermogonios y ecios pueden encontrarse en rosáceas como *Amelanchier ovalis*, *Crataegus azarolus*, *Crataegus calycina*, *Crataegus laciniata*, *Crataeg...*

Hemisferio norte....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gymnosporangium-clavariiforme>

Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)

Berberomeloe insignis es un coleóptero de gran tamaño, que puede sobrepasar los 8 cm. Su coloración totalmente negra excepto las sienas y la frente qu...

La tipología del hábitat en el que vive *B. insignis* es fundamentalmente estepario o submontano, con vegetación arbustiva o de matorral de escasa cober...

Berberomeloe insignis es un endemismo del sureste español sólo conocido de las provincias de Almería, Granada y Murcia, limitando su área de distribuc...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/berberomeloe-insignis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818) (Arthropoda)

Carcinus aestuarii Nardo, 1847 (Arthropoda)

Meloe tucius Rossi, 1792 (Arthropoda)

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Silybum eburneum Coss. & Durieu (Tracheophyta)

Sphyrion lumpi (Krøyer, 1845) (Arthropoda)

