



## Num. 760. Publicado el 21/10/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Goodyera repens*. Por César Fernández González



**Num. 760. Publicado el 21/10/2019**

## Descripciones de especies

### *Senecio altissimus* Mill.

Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 5-16 x 0,4-1,3 cm. Tallos de 0,6-1,5 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes, gla...

Trampales, prados húmedos, bordes de arroyo o acequia y claros de robleal; 0-1700 m. ...

Marruecos, España, SE de Francia, NW y C de Italia y Sicilia. Mitad N de la Península Ibérica, más raro en las montañas del SE...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-altissimus.html>

### *Hypericum montanum* L.

Hierba perenne, glabrescente, de hasta 90 cm. Tallos sin ramas estériles, en general, ni líneas realzadas. Hojas de 15-80 x 8-35 mm -relación longitud/...

Forma parte de orlas y claros de bosque (pinos, abetales, quejigares, avellanares, encinares, etc.) y en sus matorrales de sustitución en áreas fres...

Oeste, S -desde la Península Ibérica hasta Yugoslavia-, N y C de Europa hasta el C de Rusia y Crimea, y Escandinavia-, Caucasia y NW de África. Mitad ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-montanum.html>

### *Goodyera repens* (L.) R. Br.

Orquídea con un rizoma de 3-11 cm, con los restos escariosos de las vainas foliares. Tallos aéreos de (6)11-20(30) cm, delgados, huecos, verdes, con p...

Zonas musgosas de pinos, hayedos, abetales y matorrales de rododendros; 1000-2000 m....

Norte y centro de Europa -tiene su límite meridional en las montañas de Grecia, Italia y España-, Asia -N de Turquía, Cáucaso, N y C de Siberia, Himal...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/goodyera-repens.html>

### *Cheilanthes tinaei* Tod.

Helecho con un rizoma cubierto de páleas linear-lanceoladas de color castaño. Frondes de hasta 25 cm; pecíolo castaño oscuro, paleáceo hacia la base; ...

Grietas de roquedos silíceos; 0-1200 m....



Oeste de la región mediterránea, Turquía, Canarias y Madeira. Zonas mediterráneas silíceas del C, mitad O peninsular y Cataluña....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cheilanthus-tinaei.html>

## *Bidens pilosa* L.

Hierba anual, con raíces fibrosas y tallos de 25-100(150) cm, erectos, más o menos cuadrangulares -sobre todo cuando jóvenes-, ramosos, al menos en su...

Ribazos, cunetas, regueros húmedos, acequias de riego, campos de regadío, humedales, etc., en suelos de cualquier naturaleza, nitrificados y más o men...

Nativa de las áreas tropicales de Sudamérica; naturalizada en las zonas de clima suave de todos los continentes y actualmente subcosmopolita.

Litoral ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bidens-pilosa.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cheilanthus guanchica* Bolle (Pteridophyta)

*Cheilanthus maderensis* Lowe (Pteridophyta)

*Goodyera repens* (L.) R. Br. (Magnoliophyta)

*Senecio auricula* Bourq. ex Coss. (Magnoliophyta)

*Senecio bayonnensis* Boiss. (Magnoliophyta)

*Senecio boissieri* DC. (Magnoliophyta)

*Senecio eriopus* Willk. (Magnoliophyta)

*Senecio legionensis* Lange (Magnoliophyta)

*Senecio lopezii* Boiss. (Magnoliophyta)

*Senecio malacitanus* Huter (Magnoliophyta)

*Senecio quinqueradiatus* Boiss. (Magnoliophyta)

