



## Num. 772. Publicado el 13/01/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Taxodium distichum*. Por César Fernández González



**Num. 772. Publicado el 13/01/2020**

## Descripciones de especies

### *Hedypnois arenaria* DC.

Hierba anual de 10-50 cm, generalmente erecta, rara vez ascendente, no escaposa, excepcionalmente con todas las hojas basales, generalmente escábrida,...

Herbazales nitrificados de arenales costeros; 0-50 m....

Península Ibérica, NO de África (Marruecos y Argelia) y Canarias (Lanzarote). SO de la Península Ibérica, desde Extremadura hasta cerca de la ciudad d...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hedypnois-arenaria.html>

### *Gamochoaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen,

Hierba en general bienal o perenne, rara vez anual, a veces cortamente rizomatosa con rizoma hasta de 3,6 mm de diámetro. Tallos de (5)12-30(65) cm, a...

Claros de robledal, pinar o brezal-tojal, bordes de caminos, muros, taludes, cunetas, dunas costeras, viñedos y otros cultivos, en general en suelos h...

Sudamérica; naturalizada en Norteamérica, Eurasia, África, Australia y Nueva Zelanda. Dispersa por la mitad N de la Península, más rara en algunas zon...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gamochoaeta-coarctata.html>

### *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758

Córvido un poco menor que la corneja negra (*Corvus corone*), con un tamaño medio de 44,6 a 49,7cm en machos y de 43,4 a 48,2 cm en hembras, y envergadu...

Solo anida en latitudes medias boreales o templadas, tanto en tierras continentales como oceánicas, con la isoterma de julio de 12° C, ausentándose de...

Cría en Europa, desde Irlanda a Rusia y Turquía, con poblaciones muy localizadas en España y Escandinavia. También en Asia, desde los Urales a China. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corvus-frugilegus.html>

### *Chiliadenus glutinosus* Fourr.



Hierba perenne o sufruticulosa, de pubescente-glandulosa a viloso-glandulosa, viscosa, con pelos toectores pluricelulares de 0,2-5 mm y abundantes pelo...

Fisuras, grietas y rellanos de roquedos calcáreos, en general soleados, a veces también en pedregales; 0-1500(2100) m....

Sur de Francia, Península Ibérica, Mallorca y N de Marruecos. Abundante sobre todo en la mitad E de la Península, y W de Mallorca....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chiliadenus-glutinosus.html>

## *Artemisia campestris* L.

Subarbusto poco o nada aromático, con renuevos basales o subbasales, glabro, por excepción glabrescente, a menudo más o menos glutinoso, verdoso. Tall...

Orillas de camino, terrenos baldíos, matorrales degradados, taludes, arenales marítimos, en lugares secos, soleados y más o menos nitrificados; 0-1600...

Europa, N de África, SO y C de Asia. Casi toda la Península Ibérica excepto en el cuadrante SO, rara en el extremo NO....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-campestris.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Chiliadenus glutinosus* Fourr. (Magnoliophyta)

*Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

