



## Num. 772. Publicado el 13/01/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Taxodium distichum*. Por César Fernández González



Num. 772. Publicado el 13/01/2020

## Descripciones de especies

### *Hedypnois arenaria* DC.

Hierba anual de 10-50 cm, generalmente erecta, rara vez ascendente, no escaposa, excepcionalmente con todas las hojas basales, generalmente escábrida...

Herbazales nitrificados de arenales costeros; 0-50 m....

Península Ibérica, NO de África (Marruecos y Argelia) y Canarias (Lanzarote). SO de la Península Ibérica, desde Extremadura hasta cerca de la ciu...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hedypnois-arenaria>

### *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen,

Hierba en general bienal o perenne, rara vez anual, a veces cortamente rizomatosa con rizoma hasta de 3,6 mm de diámetro. Tallos de (5)12-30(65) cm, ...

Claros de robledal, pinar o brezal-tojal, bordes de caminos, muros, taludes, cunetas, dunas costeras, viñedos y otros cultivos, en general en suelos ...

Sudamérica; naturalizada en Norteamérica, Eurasia, África, Australia y Nueva Zelanda. Dispersa por la mitad N de la Península, más rara en alguna...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gamochaeta-coarctata>

### *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758

Córvido un poco menor que la corneja negra (*Corvus corone*), con un tamaño medio de 44,6 a 49,7cm en machos y de 43,4 a 48,2 cm en hembras, y enverga...

Solo anida en latitudes medias boreales o templadas, tanto en tierras continentales como oceánicas, con la isoterma de julio de 12° C, ausentándose...

Cría en Europa, desde Irlanda a Rusia y Turquía, con poblaciones muy localizadas en España y Escandinavia. También en Asia, desde los Urales a Chi...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/corvus-frugilegus>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Chiliadenus glutinosus* Fourr.

Hierba perenne o sufruticulosa, de pubescente-glandulosa a viloso-glandulosa, viscosa, con pelos tectores pluricelulares de 0,2-5 mm y abundantes pel...

Fisuras, grietas y rellanos de roquedos calcáreos, en general soleados, a veces también en pedregales; 0-1500(2100) m....

Sur de Francia, Península Ibérica, Mallorca y N de Marruecos. Abundante sobre todo en la mitad E de la Península, y W de Mallorca....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chiliadenus-glutinosus>

## *Artemisia campestris* L.

Subarbusto poco o nada aromático, con renuevos basales o subbasales, glabro, por excepción glabrescente, a menudo más o menos glutinoso, verdoso. T...

Orillas de camino, terrenos baldíos, matorrales degradados, taludes, arenales marítimos, en lugares secos, soleados y más o menos nitrificados; 0-1...

Europa, N de África, SO y C de Asia. Casi toda la Península Ibérica excepto en el cuadrante SO, rara en el extremo NO....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/artemisia-campestris>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Chiliadenus glutinosus* Fourr. (Chloroplastida)

*Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

