



## Num. 791. Publicado el 25/05/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Asplenium septentrionale*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 791. Publicado el 25/05/2020

## Descripciones de especies

### *Orgyia trigotephras* Boisduval, 1829

Mariposa con un gran dimorfismo sexual en la que las hembras son ápteras, en tanto que los machos son alados, con una envergadura alar de unos 25mm. ...

Habita en zonas secas y cálidas como garrigas, maquis o matorrales. Es una especie polífaga y bivoltina, con una generación de primavera (de abril a...

Se distribuye por el norte de África, sur de Europa y oeste de Asia...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/orgyia-trigotephras>

### *Leucanthemum cantabricum* Sennen

Hierba perenne con tallos de (25)35-60(75) cm, solitarios o numerosos, de erectos a ascendentes, no ramificados o ramificados en la mitad superior, gl...

Bordes de camino, cunetas, prados y pastizales; 0-800 m....

Mitad N de España y S de Francia. Vertiente N de la Cordillera Cantábrica y territorios circundantes, desde las estribaciones occidentales del Pirin...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-cantabricum>

### *Dryopteris tyrhena* Fraser-Jenk. & Reichst.

Helecho con frondes de (10)30-50(60) cm, persistentes en invierno. Pecíolo 1/4-3/4 de la longitud de la lámina, glanduloso y paleáceo; páleas ovad...

Gleras y roquedos silíceos; 1600-2300 m....

Montañas del O de la región mediterránea. Sierra Nevada....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-tyrrhena>

### *Biscutella valentina subsp. valentina* (Loefl. ex L.) Heywood

Planta perenne de (10)30-70(100) cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base. Hojas basales de 3-16 x 0,2-3,5 (incluidos los





asturnatura

# Revista asturnatura.com

di...

Sobre todo tipo de substratos y medios; 0-2500 m....

Región mediterránea.Dispersa por casi toda la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/biscutella-valentina-subsp-valentina>

## *Arum maculatum* L.

planta herbácea con tubérculos 1,3-3 x 1,8-4,2 cm, rizomatosos, de los que se desarrollan raíces hasta de 4,2 cm. Profilos de 6,5-13 x 0,6-2 cm, pa...

Robledales, hayedos, lugares sombríos; 500-1300 m...

Oeste, C y S de Europa, hasta el Cáucaso. N y NE de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/arum-maculatum>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Dactylis glomerata subsp. juncinella* (Bory) Stebbins & D.Zohary (Chloroplastida)

*Scorzoneroides carpetana subsp. carpetana* (Lange) Greuter (Chloroplastida)

*Scorzoneroides carpetana subsp. nevadensis* (Lange) Izuzq. (Chloroplastida)

*Solanum bonariense* L. (Chloroplastida)

*Solanum carolinense* L. (Chloroplastida)

*Solanum chenopodioides* Lam. (Chloroplastida)

