



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 841. Publicado el 10/05/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Paeonia mascula*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 841. Publicado el 10/05/2021

Descripciones de especies

Reynoutria japonica Houtt.

Planta perenne, herbácea, rizomatosa, con tallos aéreos de 2-3 m, anuales. Hojas de 5-14 x 3-13 cm, alternas, pecioladas, anchamente ovadas, truncada...

Crece en setos y bordes de caminos, en zonas bajas y húmedas; nitrófila....

Originaria de Japón, cultivada como ornamental y subspontánea en Europa. Norte de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/reynoutria-japonica>

Ranunculus alpestris subsp. leroyi M. Laínz

Planta herbácea vivaz, de (2)3-15 cm, glabra, lustrosa, con 1 o varios tallos simples, erectos o ascendentes. Rizoma corto y truncado u oblongo; raí...

Ventisqueros, cantiles umbrosos, rellanos turbosos y pastos en suelos pedregosos calcáreos; 1900-2700 m....

Cordillera Cantábrica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-alpestris-subsp-leroyi>

Mitrella minor (Scacchi, 1836)

Gasterópodo de unos 12 mm de longitud, con la concha provista de líneas de espira rectas y sutura menos definida que en el caso de *Mitrella canarien...*

Es relativamente común en los fondos fangosos infralitorales....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mitrella-minor>

Lasallia pustulata (L.) Mérat

Liquen de talos foliáceos de 3-14 cm de diámetro, umbilicados, monófilos, unidos al sustrato por un único disco de fijación situado en el centro,...

Saxícola silicícola, en bloques y roquedos de situaciones poco expuestas, generalmente enriquecidos en nutrientes. Fotófito, anemófobo, más o men...





asturnatura

Revista asturnatura.com

En todo el hemisferio norte, especialmente frecuente en el piso montano....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lasallia-pustulata>

Cystoseira humilis var. myriophylloides (Sauvageau) J.H.Price & D.M.John, 1978

Alga parda que forma céspedes que alcanza 1 m de altura. Sus cauloides, de 5-10 cm de altura, están fijados al sustrato por un disco, y sus ápices ...

Crece en cubetas y depresiones no profundas del eulitoral, en zonas ligeramente expuestas....

Desde Inglaterra a la costa cantábrica de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cystoseira-humilis-var-myriophylloides>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cystoseira humilis Schousboe ex Kützing (Ochrophyta)

Cystoseira humilis var. myriophylloides (Sauvageau) J.H.Price & D.M.John, 1978 (Ochrophyta)

