



## Num. 842. Publicado el 17/05/2021

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Carex flacca*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 842. Publicado el 17/05/2021**

## Descripciones de especies

*Pterothamnion crispum* (Ducluzeau) Nägeli, 1862

Talo formado por pequeñas matas de ejes erectos de 0.5-1.5 cm de altas, flabeladas, formadas por ejes complanados ramificados de 330-750 &micro;m de a...

Epífito en diferentes algas, incluyendo calcificadas, o epizoico en ascidias, desde el intermareal a los 10 m de profundidad, en zonas generalmente ca...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pterothamnion-crispum>

*Porpidia crustulata* (Ach.) Hertel & Knoph

Liquen de talo crustáceo más o menos grueso, difuso, delgado o areolado, de color blanco, crema o ceniciento, teñido de naranja cuando aparece sobre r...

Saxícola, en rocas, paredes, bloques silíceos y piedras de canchales y muros cerca del suelo. Sustrato higrófito, poco nitrófito. Montana...

Cosmopolita...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/porpidia-crustulata>

*Lecania naegelii* (Hepp) Diederich & van den Boom

Liquen de talo crustáceo fino, más o menos liso, de color gris verde pálido, formando pequeñas manchas entre otros líquenes crustáceos. Como fotobiont...

Cortícola, en árboles y arbustos. Subneutrófito hasta ligeramente acidófito, en cortezas ricas en minerales, medianamente fotófito. Sensible a la cont...

Holártica, templada...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lecania-naegelii>

*Cyrrillia linearis* (Montagu, 1803)

Molusco gasterópodo de 12 x 7 mm de longitud, de color crema con tintes lila en el ápice o pardo claro; estriación coloreada más oscura y visible a tr...

Ocasionalmente se encuentra bajo piedras o en charcas bajo el nivel de la marea, más comúnmente en el sublitoral en fondos de arena, conchas o gravas,...



Desde el Mediterráneo al norte de Noruega. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyrtilla-linearis>

## *Aloe maculata* All.

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero. Tallo hasta de 25 cm, erecto, con ramificación dicótoma. Hojas de 15-30 x 6-12 cm, de...

Roquedos costeros alterados; 0-100 m....

Originaria del E y S de la región de El Cabo -Sudáfrica-; naturalizada en las regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios. Localidades ais...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aloe-maculata>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acer saccharum* Marshall (Tracheophyta)

*Diversibipalium multilineatum* (Makino & Shirasawa, 1983) (Platyhelminthes)

*Pterothamnion crispum* (Ducluzau) Nägeli, 1862 (Rhodophyta)

