



## Num. 849. Publicado el 05/07/2021

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Plantago alpina*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 849. Publicado el 05/07/2021

## Descripciones de especies

### *Scorzonera hirsuta* L.

Hierba perenne de 15-50 cm, rizomatosa, no escaposa, unicaule o multicaule, sin roseta de hojas; rizoma vertical, cilíndrico, leñoso, con el ápice ...

Taludes, pastizales y claros de matorral heliófilo, en substrato calizo, margoso o silíceo, frecuentemente en afloramientos rocosos; 600-1700 m....

SO de Europa, hasta Italia y Sicilia. Mitad N de la Península Ibérica, excepto en el extremo noroccidental....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scorzonera-hirsuta>

### *Plantago monosperma subsp. discolor* (Gand.) M. Laínz

Hierba perenne, de 7-15(20) cm, acaule. Hojas 30-180 x 4-8(15) mm, en roseta basal, más o menos lanceoladas, con 1-5 nervios, con un tomento lanuginos...

Lugares descarnados y pedregosos, en suelos de reacción básica; 500-1920 m....

Endemismo del centro norte de la Península Ibérica y Sistema Ibérico....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/plantago-monosperma-subsp-discolor>

### *Phaeographis dendritica* (Ach.) Müll

Liquen de talos crustáceo, fino, de color grisáceo o gris amarillento, liso o con ligeras fracturas que le dan un aspecto rimoso areolado, con hifas...

Cortícola, en árboles con áreas de cortezas lisas, o en ejemplares viejos del género Quercus. Especie indicadora de bosques maduros, bien estructu...

Más frecuente en territorios holárticos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phaeographis-dendritica>

### *Paeonia broteri* Boiss. & Reut.

Hierba vivaz, rizomatosa con tallos de hasta 70 cm, unifloros, glabros, a menudo teñidos de rojo. Hojas uni o biternadas; las inferiores, biternadas, ...

Sotobosques de robledales, quejigares, encinares, alcornoques y bosques de ribera; suelos ácidos o básicos; 100-1850 m....





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Principalmente en la mitad W de la Península Ibérica, excepto en el NW de Portugal, gran parte de Galicia y la Cornisa Cantábrica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/paeonia-broteri>

## ***Mordellistena neuwaldeggiana*** (Panzer, 1796)

Coleóptero de longitud de tres a cuatro milímetros sin contar la punta en la que acaba el abdomen. Coloración amarillo-rojo en la parte superior e ...

Se encuentra de abril a septiembre en los bordes de los bosques expuestos al sol y en lugares despejados del bosque caducifolio. Los imagos se pueden ...

Se encuentra distribuido por casi toda Europa, hasta el sur de Suecia, Ucrania y Turquía...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mordellistena-neuwaldeggiana>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Abelmoschus esculentus* Moench (L.) (Chloroplastida)

*Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod (Basidiomycota)

*Amandinea punctata* (Hoffm.) Coppins & Scheid. (Ascomycota)

*Apothyale prevostii* (Milne Edwards, 1830) (Arthropoda)

*Apus pallidus* (Shelley, 1870) (Chordata)

*Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) (Chordata)

*Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1829) (Chordata)





- Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) (Chordata)
- Cornus florida* L. (Chloroplastida)
- Cornus mas* L. (Chloroplastida)
- Cryptocline taxicola* (Allesch.) Petr. (Ascomycota)
- Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 (Chordata)
- Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775) (Arthropoda)
- Depressaria chaerophylli* Zeller, 1839 (Arthropoda)
- Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758 (Chordata)
- Falco columbarius* Linnaeus, 1758 (Chordata)
- Gallotia galloti subsp. eisentrauti* (Bischoff, 1982) (Chordata)
- Hippolyte inermis* Leach, 1816 (Arthropoda)
- Hypera nigrirostris* (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
- Malpolon monspessulanus* (Chordata)
- Mecyna asinalis* (Hübner, 1819) (Arthropoda)
- Mordellistena neuwaldeggiana* (Panzer, 1796) (Arthropoda)
- Passer montanus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)
- Phaeographis dendritica* (Ach.) Müll (Ascomycota)
- Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) (Chordata)
- Physcia biziana* (A. Massal.) Zahlbr. (Ascomycota)
- Pterocles orientalis* (Linnaeus, 1758) (Chordata)





*Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Rhizostoma luteum* (Quoy & Gaimard, 1827) (Cnidaria)

*Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Solanum mauritianum* Scop. (Chloroplastida)

*Sphodromantis viridis* (Forskål, 1775) (Arthropoda)

*Sylvia borin* (Boddaert, 1783) (Chordata)

*Sylvia hortensis* (Gmelin, 1789) (Chordata)

*Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777) (Arthropoda)

