



Num. 857. Publicado el 30/08/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rosa villosa*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 857. Publicado el 30/08/2021

Descripciones de especies

Rosa micrantha Borrer ex Sm.

Arbusto de 0,5-2(3) m con tallos erectos o arqueados, de ramificación variada, rojizos o verdosos; acúleos, que a veces faltan, de 3-5(9) x 3-7 mm, ho...

Orla espinosa del sabinar, y setos en los encinares, quejigares, pinares, olmedas, etc.; prefiere los substratos básicos; (30)200-1600(1900) m....

Gran parte de Europa -hasta el paralelo 60° N y desde la Península Ibérica e Irlanda hasta el C y S de Rusia, Crimea y el Cáucaso-, el Líbano y NW de ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosa-micrantha>

Rosa corymbifera Borkh.

Arbusto de (0,5)1-3(6) m, tomentoso, con tallos más o menos erectos o arqueados, numerosos, robustos, en general verdosos; acúleos (3)5-8(10) x 3-4(7)...

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, pinares, etc.; 0-2000 m....

Gran parte de Europa, el Cáucaso, C de Asia, Pakistán, Afganistán, el Irán, Irak, Anatolia, Siria, Líbano, Palestina, NW de África, Canarias y Azores;...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosa-corymbifera>

Leucanthemopsis boissieri Pedrol

Hierba perenne -a veces con base algo lignificada-, cespitosa, con numerosas rosetas, muchas de ellas no floríferas, de un verde blanquecino o verdosa...

Pastos de alta montaña, matorrales o roquedos, en substratos arenosos no carbonatados; (1900)2000-2400 m....

Montañas graníticas del Sistema Central, desde la Sierra de Béjar a la de Guadarrama. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemopsis-boissieri>

Glyceria declinata Bréb.

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos de hasta de 87 cm, decumbentes en la base y después ascendentes, con la parte superior por lo general flotante ...

Acequias, cunetas encharcadas, charcas, manantiales, arroyos de aguas lentas, lagunas, márgenes de ríos, prados húmedos, tremedales, landas,



juncales ...

Europa, Marruecos y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); introducida en Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda y Hawái, y para algun...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/glyceria-declinata>

Echium salmanticum Lag.

Hierba de 65-80(100) cm, perenne, hasta con 50 tallos, hispida. Tallos erectos o ascendentes, generalmente poco o nada ramificados, con indumento dobl...

Pastizales, taludes, cunetas y bordes de carreteras, en substrato ácido; 300-1250 m....

Endemismo del CO de la Península Ibérica -común en España, muy rara en Portugal-....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echium-salmanticum>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calypogeia azurea Stotler & Crotz (Marchantiophyta)

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Rosa vosagiaca N.H.F. Desp. (Tracheophyta)

Stenostola dubia (Laicharting , 1784) (Arthropoda)

