



## Num. 874. Publicado el 27/12/2021

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Egretta garzetta*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 874. Publicado el 27/12/2021**

## Descripciones de especies

*Variospora flavescens* (Huds.) Arup, Frödén & Söchting

Liquen con un talo de color amarillo o anaranjado, sin pruina o débilmente pruinoso, bastante liso, mate o poco brillante, crustáceo, generalmente for...

Crece sobre caliza, en zonas abiertas y en bosques aclarados, también en muros de caliza....

Se encuentra desde la Región Mediterránea hasta Europa central y las Islas Británicas y puntualmente en el sur de Escandinavia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/variospora-flavescens.html>

*Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758

El rascón es un rállido de 22-28 cm de longitud y 38-45 cm de envergadura, más voluminoso que las polluelas y con un pico de color rojo intenso que ay...

El rascón europeo vive en humedales, generalmente aquellos de aguas dulces estancadas si bien puede observarse en playas arenosas de fondo fangoso, de...

El rascón europeo aparece en la mayor parte de Europa y Asia si bien no está presente en las zonas más nórdicas. La mayor parte de la población aparec...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rallus-aquaticus.html>

*Metopoplax ditomoides* (A. Costa, 1847)

Insecto con un tamaño de 3,4 a 4 mm de longitud. La cabeza, el pronoto y el escutelo están densamente salpicados y cubiertos de finos pelos blancos. ...

Vive en hábitas cálidos y secos, escasamente cubiertos de maleza, como los bordes de los campos y senderos, así como en áreas ruderales. e alimentan d...

La especie se distribuye desde el suroeste de Europa hasta Alemania. También se encuentra en el oeste de África del Norte hasta Túnez. Ha sido introdu...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/metopoplax-ditomoides.html>

*Daucus carota subsp. sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens

Planta bienal o perennizante, de 50-78 cm, erecta, ramificada desde la base. Raíz napiforme, engrosada, carnosa, de color blanquecino, amarillo,



naran...

Cultivada en las huertas, de casi todo el territorio, muy raramente asilvestrada; 0-1500 m....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/daucus-carota-subsp-sativus.html>

## *Alopochen aegyptiaca* (Linnaeus, 1766)

El ganso del Nilo es un anátida de 63-73 cm de longitud y casi 1.5 m de envergadura, de un tamaño intermedio entre un ánzar y un ánade. Es de color pr...

En su área de distribución natura, el ganso del Nilo La especie habita en una amplia gama de humedales de agua dulce en campo abierto desde el nivel d...

El área natural de distribución del ganso del Nilo es el África subsahariana. Fue establecido en Alemania con anterioridad a los años 60 y en Bélgica ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alopochen-aegyptiaca.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anas aegyptiaca* Linnaeus, 1766 (Chordata)

*Anas galericulata* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Anas sponsa* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Ardea garzetta* Linnaeus, 1766 (Chordata)

*Metopoplax ditomoides* (A. Costa, 1847) (Arthropoda)

*Pachymerus ditomoides* Costa, 1847 (Arthropoda)

