



Num. 88. Publicado el 14/08/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Handkea excipuliformis*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 88. Publicado el 14/08/2006

Descripciones de especies

Spergularia media (L.) C. Presl

Planta herbácea perenne, con una cepa leñosa relativamente robusta, glabra o glandulosa - pubescente sólo en la inflorescencia. Los tallos, de postrad...

Vive en arenales costeros, en marismas y cubetas salinas interiores, desde el nivel del mar a los 1300 m....

Subcosmopolita....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-media>

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla

Rizoma de entrenudos largos, hasta de 4 mm de diámetro. Tallos de (9)21- 80(150) cm x (1,2)2,3-3,1(5) mm, agudamente trígono, con las caras de cóncav...

Lagunas, marismas, remansos fluviales y juncuales marítimos, más raramente en aguas tranquilas del interior; 0-360 m....

Europa occidental hasta Italia, América, Australia y Nueva Zelanda. Dispersa por el N de la Península Ibérica y bajo Guadiana....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectus-pungens>

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott

Arbustillo de hasta 1m o más de altura, de porte erecto y bastante ramificado. La parte basal de los tallos es leñosa y las ramas son erectas o erecto...

Vive en suelos húmedos salobres en el supraestero de las marisma externa halófila, que no son inundados más que por las pleamares. ...

Está distribuida por el Mediterráneo y la costa atlántica sur. En el Cantábrico sus poblaciones son bastante escasas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sarcocornia-fruticosa>

Salsola kali L.

Planta anual, hispida, de hasta 60 cm, erecta o erecta ascendente, ramificada desde su base y de color verde. Las hojas son alternas, cilíndricas o sem...

Es una planta típica de arenales costeros aunque también es pionera en lugares removidos y barbechos....

Costas de Europa hasta los 60° 30'

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salsola-kali>



Limonium vulgare Mill.

Planta perenne, pluricaule y glabra, de 15 a 70 cm, con las hojas formando una roseta basal. Éstas son verdes durante la floración, enteras, de 10 - 3...

Vive en suelos muy húmedos y salobres de las marismas externas halófilas de los estuarios. Preferentemente en suelos mal drenados que se mantienen muy...

Litoral atlántico europeo desde el sudoeste de España hasta el sudoeste de Suecia. Ha sido citada de las Islas Azores, aunque las poblaciones allí exi...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limonium-vulgare>

Limonium humile Mill.

Planta perenne, pluricaule y glabra, de 10 a 40 cm, con las hojas formando una roseta basal. Éstas son verdes durante la floración, enteras, de 6 - 20...

Suelos limosos o arcillosos, muy salobres, de la parte baja del estero en las marismas externas subhalófilas. Se ha señalado su presencia también en a...

Litorales de las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania, Bretaña y Cantábrico. Hay pocas poblaciones en el Cantábrico....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limonium-humile>

Juncus maritimus Lam.

Hierba perenne, de 30-150 cm, laxamente cespitosa, con brotes principalmente extravaginales y a veces con algún brote intravaginal; rizoma más o menos...

Praderas-juncales halófilas, en suelos permanentemente húmedos, ricos en cloruros y carbonatos; 0-1000(1500) m. ...

Centro y oeste de Europa, región mediterránea, W de Asia, y N de África. Litoral y lagunas saladas del interior de la Península, y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-maritimus>

Chamaesyce peplis (L.) Prokh.

Planta anual, glabra, que al cortarla emite un látex blanco, de color glauco y que mide de 5 a 20 cm. La raíz pivotante y los tallos tumbados, muy ram...

Bordes de playas nitrificados por los depósitos de marea (arribazones)....

Esta planta aparece en los litorales de la cuenca mediterránea y atlántica suroccidental europea hasta el sur de Bretaña y pocas localidades en la pen...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-peplis>



Aster tripolium L.

Hierba bienal o perenne de vida corta, con un rizoma corto más o menos vertical de 9-28 x 2-8 mm del que nace un fascículo de raíces más o menos engro...

Juncals y matorrales halófilos en zonas de inundación mareal de estuarios y marismas, acantilados marinos, depresiones inundadas de dunas y saladares...

Costas europeas, desde el n de noruega -Mar de Barents, hasta los 70° n- hasta Rumania, más algunas zonas continentales del W, y C de Europa, Argelia ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aster-tripolium>

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Se trata de un sapo pequeño, de no mas de 5 cm de longitud, de aspecto rechoncho, el morro redondeado y la cabeza más larga que ancha. Ojos laterales,...

Es una especie de hábitos muy terrestres y de actividad nocturna. Se encuentra en gran cantidad de hábitats diferentes, montañas, bosques, riberas, pr...

Se encuentra presente en la mayor parte de la península, únicamente falta en las islas Baleares. En el centro y sur peninsular su presencia se restrin...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alytes-obstetricans>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Tracheophyta)

Kickxia elatine (L.) Dumort. (Tracheophyta)

Scutellaria minor Huds. (Tracheophyta)

