



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 893. Publicado el 09/05/2022

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Polydrusus formosus*. Por José Rafael González López



Num. 893. Publicado el 09/05/2022

## Descripciones de especies

### *Selenops radiatus* Latreille, 1819

Araña muy comprimida dorsoventralmente, con una longitud corporal de 16,5 mm. Prosoma plano y más ancho que largo, de color marrón claro y cubierto...

*Selenops radiatus* se encuentra debajo de la corteza de los troncos de los árboles y debajo de las piedras. Al igual que otros miembros de la familia,...

Se encuentra en el Mediterráneo, África, India, Birmania y China. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/selenops-radiatus>

### *Penthaleus major* (Duges, 1834)

Conocido como arañuela oscura de los pastos, es un ácaro con una longitud corporal de 0,8 a 1 mm. Adulto de coloración azulada a pardo verdosa, con...

No tejen tela. Las hembras depositan sus huevos sobre las hojas, o en la base de los tallos, en forma aislada. Estos huevos son de forma arriñonada y...

Se encuentran registros de esta especie en todos los continentes excepto la Antártida....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/penthaleus-major>

### *Crustulina guttata* (Wider, 1834)

Araña con una longitud corporal de 2 a 2,5 mm. Color general marrón oscuro a negro. Quelíceros marrón oscuro. Prosoma marrón oscuro, a veces marr...

Vive principalmente en la hojarasca del suelo y debajo de las piedras en los claros y en los bordes soleados de bosques. Construye una pequeña red de...

Canarias, Europa, Cáucaso, Rusia, Kazajstán....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/crustulina-guttata>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Cenchrus longisetus* M.C.Johnst.

Hierba perenne, cespitosa, con rizomas cortos. Tallos de 15-70 cm, por lo general numerosos, ramificados hacia la base, erguidos, a veces algo acodado...

Introducida como ornamental y para fijar taludes en carreteras y autopistas, y asilvestrada en bordes de caminos, baldíos y eriales, en terrenos de n...

Originaria de las áreas subtropicales del NE de África y la Península Arábiga; cultivada como forraje o para fijar taludes en terrenos áridos, y ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-longisetus>

## *Alopecurus aequalis* Sobol.

Hierba anual o bienal con tallos de 14-45 cm, por lo general numerosos, erectos o tendidos, muchas veces enraizantes en los nudos inferiores, finalmen...

Márgenes de charcas, embalses y otras zonas temporalmente encharcadas; 100-2000 m....

Europa, Asia, N de África y América septentrional; naturalizada en Australia, Nueva Zelanda y S de América. Dispersa principalmente por la mitad se...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/alopecurus-aequalis>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Caulacanthus okamurae* Yamada, 1933 (Rhodophyta)

*Polydius hispanus subsp. ludificator* Gyllenhal, 1833 (Arthropoda)

*Polydrusus formosus* (Mayer, 1779) (Arthropoda)

*Xylographa parallela* (Ach.) Fr. (Ascomycota)

