



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 898. Publicado el 13/06/2022

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Carex brevicollis*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 898. Publicado el 13/06/2022

Descripciones de especies

Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857)

La tórtola rosigris tiene una longitud de 29-30 cm y una envergadura de 45-50 cm. El plumaje puede variar del blanco al crema pálido o presentar ton...

En su zona nativa la tórtola rosigris vive en subdesiertos y estepas sabanoides, pero en España se limita a jardines y áreas arboladas de zonas urb...

De forma natural aparece por África subsahariana y la Península Arábiga. Existen poblaciones introducidas asilvestradas en Europa, América del No...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-roseogrisea>

Polypodium interjectum Shivas

Helecho con páleas del rizoma de 3,5-10 mm, anchamente ovado-lanceoladas, abruptamente acuminadas, castaño-oscuros. Frondes de hasta 53 cm; lámina ...

Repisas, grietas de roquedos, muros o troncos de árbol, a veces sobre capa muscinal; 0-1500 m....

Europa, Marruecos, Anatolia y W de Asia. Frecuente en el N, más raro en los sistemas montañosos de Cataluña, C y O peninsular....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/polypodium-interjectum>

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.

Tallos postrado-radicantes, con ramas fértiles erectas, ambos de simetría radiada; tallos principales subleñosos, que tienden al monopodismo; ramas...

Lugares húmedos y umbrosos....

Zonas tropicales y subtropicales, naturalizado en Macaronesia, Sicilia y Serra de Valongo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lycopodiella-cernua>

Dianthus laricifolius subsp. merinoi (M. Laínz) M. Laínz

Planta perenne, cespitosa, de cepa lignificada. Tallos floríferos de (5)10-30(55) cm, simples o más o menos ramificados, a veces de modo





asturnatura

Revista asturnatura.com

notable.Hoja...

Litosuelos y rocas de tipo diverso (calizas, cuarcitas, pizarras); 350-1000 m....

Endemismo del E de Orense y zonas leonesas próximas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dianthus-laricifolius-subsp-merinoi>

Carex sempervirens Vill.

Densamente cespitosa, con rizoma muy grueso. Tallos (10)15-30(50) cm, obtusamente trígono, lisos o raramente con algunos acúleos en la zona superior...

Prados pedregosos y gleras de zonas de montaña; 500-2700 m....

Endemismo europeo: Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Jura, Apeninos, Balcanes, Tatras y Cárpatos. Cordillera Cantábrica y Pirineos....

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-sempervirens>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb & Berthel. (Chloroplastida)

Araneus annulipes (Lucas, 1838) (Arthropoda)

Arion intermedius Normand, 1852 (Mollusca)

Carex sempervirens subsp. pseudotristis (Domin) Pawl. (Chloroplastida)

Carex sempervirens subsp. sempervirens Vill. (Chloroplastida)

Chalcides viridanus (Gravenhorst, 1851) (Chordata)

Eudolycoris alluaudi (Noualhier, 1893) (Arthropoda)

Eurydema lundbladi Lindberg, 1960 (Arthropoda)

Nepeta teydea Webb & Berthel. (Chloroplastida)





Revista asturnatura.com

asturnatura

Pimelia ascendens Wollaston, 1864 (Arthropoda)

Pterocephalus lasiospermus Link (Chloroplastida)

Spartocytisus supranubius Christ (Chloroplastida)



9 771887 506008