



## Num. 899. Publicado el 20/06/2022

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cenchrus clandestinus*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 899. Publicado el 20/06/2022

## Descripciones de especies

### *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Ave de 26-28 cm de longitud y 47-53 cm de envergadura, de cuerpo esbelto, ligera y delicada. Su dorso y hombro muestra tonos anaranjados y moteados de...

La tórtola europea vive en medios abiertos y cálidos, con una preferencia por mosaicos de hábitat donde alternen pastizales y cultivos con setos ar...

Se extiende por toda Europa, Asia central (hasta el norte y el centro de China), la Península Arábiga y el África tropical. Se reconocen cuatro sub...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-turtur>

### *Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone

Hierba perenne, postrada, rizomatosa, cundidora, con estolones robustos, largos, muy ramosos, radicantes en casi todos los nudos. Tallos florales de 3...

Herbazales antropizados de terrenos removidos, bordes de caminos, eriales, etc., de ordinario en áreas litorales de clima suave; 0-170 m....

Originaria de las áreas subtropicales del E y NE de África; introducida en América, S de África, Madagascar, Región Mediterránea, Macaronesia, O...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-clandestinus>

### *Avena strigosa* Schreb.

Hierba anual con tallos de 40-140 cm, de 2-5 mm de diámetro, erectos o ascendentes, ligeramente estriados, glabros, con 2-4 nudos. Hojas con vaina ab...

En bordes de caminos y campos de cultivo, en substratos arenosos o ácidos; 0-1000 m....

Cultivada y naturalizada en gran parte de Europa, de donde es originaria, principalmente en la fachada atlántica y sus islas; rara en la Región Medi...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/avena-strigosa>

### *Avena barbata* Pott ex Link

Hierba anual con tallos de (14)25-160(190) cm, de (1)2-5(7) mm de diámetro, erectos, o geniculado-ascendentes, rara vez decumbentes, más o





asturnatura

# Revista asturnatura.com

menos est...

Pastos de terófitos y herbazales subnitrófilos, frecuentemente en substrato arenoso, pedregoso, removido o poco profundo; 0-1700 m....

Regiones Macaronésica, Mediterránea e Irano-Turánica; introducida en otras partes del mundo. Todo el territorio....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/avena-barbata>

## *Acmaeodera guayarmina* Volkovitsh & Liberto, 2002

Cuerpo mediano con una longitud de 8,0 (6,0-9,9) mm, y una anchura de 2,2 (1,7-2,8)mm. alargados, ancho y aplanado, sin curvatura dorsal o con curvatu...

Los ejemplares adultos se alimentan de Adenocarpus. Las larvas se alimentan de la albura y duramen en ramas de un diámetro desde 30 hasta 80 mm aprox...

Endemismo canario, presente en Gran Canaria y Tenerife....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/acmaeodera-guayarmina>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acmaeodera guayarmina* Volkovitsh & Liberto, 2002 (Arthropoda)

*Helichrysum thianschanicum* Regel (Chloroplastida)

*Hoplia philanthus* (Fuesslin, 1775) (Arthropoda)

*Ionaspis ceracea* (Arnold) Jatta (Ascomycota)

*Philoscia affinis* Verhoeff, 1908 (Arthropoda)

*Sarcogyne hypophaea* (Nyl.) Arnold (Ascomycota)

