



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 900. Publicado el 27/06/2022

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Heterotemna tenuicornis*. Por José Rafael González López



Num. 900. Publicado el 27/06/2022

## Descripciones de especies

### *Sedum mucizonia* (Ortega) Raym.-Hamet

Planta anual, verdosa, a veces rosada, generalmente con indumento glandulífero, a veces glabra salvo la inflorescencia. Raíz principal más o menos ...

Fisuras de rocas, lugares arenosos, muros, etc., indiferente al substrato; 100-2200 m....

Península Ibérica y N de África. Dispersa por el C y S de la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sedum-mucizonia>

### *Pycnocomon intermedium* Greuter & Burdet (Lag.)

Hierba perenne, a menudo multicaule. Tallos hasta de 90 cm, erectos, ramificados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros o esparcidamen...

Pastos en suelos arenosos costeros y del interior, móviles y fijos, cauces de ríos, etc.; 0-250 m....

Endemismo del cuadrante SO y S de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pycnocomon-intermedium>

### *Potentilla asturica* Rothm.

Hierba vivaz con una cepa de 2,2-5 mm de diámetro, en general ramificada; tallos fértiles de 12-50(70) cm, de 1,2-3,5 mm de diámetro en la base, te...

Pastos, claros de bosque, cervunales aclarados, cunetas y taludes herbosos; principalmente en zonas montanas y substrato silíceo; 650-1900 m....

Endemismo de Sierra Segundera, Montes de León, O de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y O de la penillanura del Duero....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/potentilla-asturica>

### *Pistorinia breviflora* Boiss.

Planta de 6-14 cm, anual, piloso-glandulosa. Tallos más robustos que los de la especie anterior, erectos, con o sin ramificaciones, las que son arque...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Pedregales, suelos básicos; 0-700 m....

Sur de España y N de África. Cádiz, Málaga y Sevilla....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pistorinia-breviflora>

## *Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758)

Mosca cuyos imagos miden 14 mm (machos) y 17 mm (hembras) de largo y tienen una constitución delgada. Cabeza más ancha que el tórax y presentando p...

El apareamiento ocurre dos días tras la eclosión y en vuelo: el macho atrapa a la hembra en vuelo y se adhiere a ella por el abdomen; a continuación...

Especie nativa de las latitudes tropicales y subtropicales de América, probablemente de América del Sur. Hoy en día se clasifica como un neozooario ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hermetia-illucens>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Bombus canariensis* Pérez, 1895 (Arthropoda)

*Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

*Convolvulus canariensis* L. (Chloroplastida)

*Eucera gracilipes* Pérez, 1895 (Arthropoda)

*Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Heterotemna tenuicornis* (Brullé, 1839) (Arthropoda)

*Notonecta canariensis* Kirkaldy, 1897 (Arthropoda)

*Pistorinia breviflora* Boiss. (Chloroplastida)

*Trapelia coarctata* (Turner) M. Choisy, in Werner (Ascomycota)

