



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 907. Publicado el 15/08/2022

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sitta europaea*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 907. Publicado el 15/08/2022

Descripciones de especies

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

El ruiseñor común es un ave de 16,5 cm de longitud y 23-26 cm de envergadura, estilizada, de pico fino y cola larga. Las hembras y machos son iguales...

Suele criar por debajo de los 1.000 metros de altitud, aunque en numerosos enclaves supera esta cota. Se observa en un amplio espectro de ambientes, p...

El ruiseñor común se reproduce en gran parte de la mitad meridional de Europa, y también está presente en Asia, desde Turquía hasta el mar Caspio...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/luscinia-megarhynchos>

Fraxinus angustifolia Vahl

Árbol hasta de 15(25) m, polígamo, con corteza profundamente agrietada en los ejemplares adultos, grisácea. Ramas amarillas o pardo-grisáceas, las...

Bordes de cursos de agua y bosques umbríos mixtos, en substrato limoso, profundo y fresco; 0- 1350 m....

Sur y centro de Europa, NO de África y SO de Asia. Ampliamente representada en la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/fraxinus-angustifolia>

Centaurea benedicta (L.) L.

Hierba anual, con raíz axonomorfa, inerme -excepto las brácteas involucrales y los dentículos espinulosos de las hojas-, verde o de un verde cano, ...

Campos, pastos y baldíos, en substratos ácidos o básicos; (0)50-1200 m....

Sur de Europa, NO de África -Argelia- y O y SO de Asia; naturalizada en diversas regiones del hemisferio norte. Dispersa por la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/centaurea-benedicta>

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb





asturnatura

Revista asturnatura.com

Arborescente, de hasta 4-5 m, con tallo cilíndrico, formando un tronco leñoso de hasta 10 cm de diámetro en la base. Ramas 3,5-5 cm de diámetro, v...

Ocasionalmente naturalizada en lugares habitados del litoral mediterráneo; indiferente a la naturaleza del suelo....

Originaria del S del Perú. Subespontánea en puntos dispersos del litoral mediterráneo peninsular....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/austrocylindropuntia-subulata>

Alnus lusitanica Vít, Douda & Mandák

Árbol de hasta 25 m de altura, con la corteza grisácea o parda en ejemplares jóvenes. Yemas oblongas, glabras o densamente pelosas y compuestas por...

Vive en los márgenes de ríos y riberas, en los fondos de los valles, zonas inundadas y laderas húmedas, de aguas frecuentemente renovadas....

Alnus lusitanica aparece en el occidente de la península Ibérica y el extremo noroccidental africano....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/alnus-lusitanica>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alnus lusitanica Vít, Douda & Mandák (Chloroplastida)

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl (Chloroplastida)

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso (Chloroplastida)

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 (Chordata)

