



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 909. Publicado el 29/08/2022

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cyperus fuscus*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 909. Publicado el 29/08/2022

Descripciones de especies

Hemicycla bethencourtiana (Shuttleworth, 1852)

Gasterópodo terrestre con una concha de diámetro entre 15-23 mm y altura de 9-15 mm. En la zona costera, la concha es típicamente imperforada, de f...

Vive desde el nivel del mar hasta una altitud de 1400 m, lo que hace que se adapte a varios biotopos distintos, en las zonas más bajas vive en malpai...

Hemicycla bethencourtiana es un endemismo canario de la costa oriental de la isla de Tenerife....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hemicycla-bethencourtiana>

Filistata insidiatrix (Forskål, 1775)

Araña de patas fuertes y pedipalpos largos; con un prosoma de color marrón amarillento, con pilosidad clara, finamente bordeado de negro y con una z...

Prefiere lugares con sombra, donde tejen una telaraña muy reticulada, azulada, del tamaño de una mano en los agujeros en las paredes, debajo de las ...

Filistata insidiatrix aparece por la región mediterránea, al este de Turkmenistán y en las islas de Cabo Verde. Por el norte penetra hasta el extre...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/filistata-insidiatrix>

Euphorbia characias L.

Planta perenne, fétida, pelosa, con rizoma grueso y tallos hasta de 150 cm, erectos, con cicatrices y leñosos en la base, ramificados en su parte in...

Lugares abiertos y soleados, a menudo alterados o pastoreados, preferentemente calcícola; 0-1600(2000)....

Mediterráneo occidental hasta Italia y Creta, N de África (Marruecos y Libia); introducida en Inglaterra, Argentina y Nueva Zelanda. En casi toda la...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-characias>

Cyperus fuscus L.





asturnatura

Revista asturnatura.com

Planta herbácea, anual, cespitosa, con tallos de (2,7)6-13(52) cm, fasciculados, numerosos, rectos, trígono. Hojas de (3,9)5,5-11,4(52) x 0,1-0,4 cm...

Zonas temporalmente encharcadas, prados húmedos, colas de pantanos, arrozales; 0-1200 m....

Centroeuropa y región mediterránea. Dispersa por casi toda la parte mediterránea de la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cyperus-fuscus>

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

El aguilucho cenizo es una rapaz de 39-46 cm de longitud y 102-116 cm de envergadura, de mediano tamaño y formas particularmente esbeltas, que se car...

El aguilucho cenizo es un ave propia de grandes extensiones abiertas y, en general, desarboladas, desde herbazales y brezales de montaña hasta carriz...

El aguilucho cenizo presenta una distribución euroasiática, que se extiende, si bien de forma discontinua, desde la Península Ibérica y el norte d...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/circus-pygargus>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Filistata insidiatrix (Forskål, 1775) (Arthropoda)

Hemicycla bethencourtiana (Shuttleworth, 1852) (Mollusca)

Maja brachydactyla Balss, 1922 (Arthropoda)

