



Num. 930. Publicado el 23/01/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Phalaropus fulicarius*. Por José Rafael González López



Num. 930. Publicado el 23/01/2023

Descripciones de especies

Trifolium phleoides subsp. willkommii (Chabert) Muñoz Rodr.

Hierba anual, pelosa. Tallos 5-30 cm, erectos o ascendentes, con pelos patentes en la parte inferior y adpresos en la superior. Hojas alternas, estipul...

Pastos, en substratos arenosos; (380)500-1600 m. ...

Península Ibérica y NW de Marruecos. Diseminada por la mayor parte del interior de la Península, principalmente en el Sistema Central, Sistema Ibé...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/trifolium-phleoides-subsp-willkommii>

Scarites cyclops Crotch, 1871

Insecto con una longitud de 20 a 40 mm. Coloración general negra uniforme y brillante. Protórax dos veces más ancho que largo, con forma de copa y ...

Habitan en lugares arenosos y soleados, pasando el día escondidos bajo piedras, madera o en galerías excavadas por ellos u otros pequeños animales....

Mediterráneo occidental: sur de la Península Ibérica y norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scarites-cyclops>

Misopates calycinum (Vent.) Rothm.

Hierba anual hasta de 90 cm, generalmente glabra en la parte inferior, de glabra a densamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos ascend...

Bordes de caminos, cultivos abandonados, barbechos, solares, siempre en suelos removidos, nitrificados pero con cierta humedad edáfica, indiferente a...

Oeste de la región mediterránea, S de Europa (España y Portugal) y N de África (Magreb). SW de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/misopates-calycinum>

Carex brachystachys Schrank in Schrank & K. Moll





asturnatura

Revista asturnatura.com

Planta herbácea densamente cespitosa con tallos de (5)10-35(45) cm, obtusamente trígonos, lisos. Hojas de 0,3-1(1,5) mm de anchura, de menor longitud...

Fisuras y taludes húmedos de las altas montañas calcáreas; (1200)1800-2600 m....

Endemismo de las montañas del C y S de Europa: Alemania, Austria, antigua Checoslovaquia, España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y antigu...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-brachystachys>

Carex basilaris Jord.

Planta densamente cespitosa con tallos de (2,5)15-35(50) cm, trígonos, lisos o escábridos en la zona superior. Hojas (1)1,5-4(5) mm de anchura, de me...

Cervunales y prados psicroxerófilos, encinares y pinares; 300-2500 m....

Norte de España, SE de Francia e Italia. Las poblaciones montañosas de Marruecos podrían pertenecer a esta subespecie. En la Península Ibérica ha...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-basilaris>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Poecile palustris (Linnaeus, 1758) (Chordata)

