



## Num. 933. Publicado el 13/02/2023

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Vanellus vanellus*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 933. Publicado el 13/02/2023

## Descripciones de especies

### *Turdus iliacus* Linnaeus, 1758

El zorzal alirrojo es un tórido de 19-23 cm de longitud y 33-34,5 cm de envergadura, de pequeño tamaño, compacto, cola relativamente corta, sin di...

En sus áreas de invernada, el zorzal alirrojo muestra un comportamiento nómada que lo lleva a recorrer largas distancias en poco tiempo, para pasar ...

La especie cría en latitudes bastante altas de Europa y Asia, desde Islandia hasta el este de Siberia. Se conocen varias subespecies. El zorzal alirr...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/turdus-iliacus>

### *Timarcha cyanescens* Fairmaire, 1862

Crisomélido con una longitud de 8 a 10 mm. Coloración azul-negrizca, brillante, a veces violáceo. Cabeza punteada no muy densamente; el escudo imp...

Sus plantas nutricias son Galium y Plantago. Se encuentra desde el nivel del mar hasta alturas elevadas....

Suroeste de Francia y norte de España (País Vasco, Cantabria y Asturias hasta Llanes, Navarra, La Rioja, y norte de Burgos)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/timarcha-cyanescens>

### *Ochrolechia parella* (L.) A. Massal.

Talos crustáceos delgados, lisos o fisurados, continuos, de colores claros, blanco, gris, crema. Sin córtex superior o poco diferenciado. Fotobionte...

Cortícola, en cortezas de alisos, sauces y sobre todo abedules. Sustratohigrófito, oceánica....

Holártica, boreal templada, rara....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ochrolechia-parella>

### *Ischyropsalis nodifera* Simon, 1879

Los ischyropsálidos son unos opiliones bastante llamativos y fácilmente distinguibles por poseer unos quelíceros robustos, negros y más largos que...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Los representantes del género *Ischyropsalis* son endémicos de Europa, habitan en zonas montañosas húmedas y son hallados con frecuencia en bosques ...

Endemismo ibérico del norte de la Península, se extiende desde los Pirineos Occidentales hasta Picos de Europa (extremo este de Asturias) (Prieto 19...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ischyropsalis-nodifera>

## ***Carex caudata*** (Kük.) Pereda & M. Laínz

Planta herbácea laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos largos. Tallos de (20)30-90 cm, trígonos, generalmente lisos. Hojas de 0,8-2,5(3,5) mm ...

Hayedos; 600-2050 m....

Endemismo del País Vasco y cornisa cantábrica....

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-caudata>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Amblyjoppa fuscipennis* (Wesmael, 1845) (Arthropoda)

*Blastobasis decolorella* (Wollaston, 1858) (Arthropoda)

*Buellia disciformis* (Fr.) Mudd (Ascomycota)

*Chrysolina herbacea* (Duftschmid, 1825) (Arthropoda)

*Chrysomela cuprea* Fabricius, 1775 (Arthropoda)

*Clytra quadripunctata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Limacus flavus* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Melitaea nevadensis* Oberthür, 1904 (Arthropoda)

*Ochrolechia parella* (L.) A. Massal. (Ascomycota)





# Revista asturnatura.com

**asturnatura**

*Ruscus streptophyllus* Yeo (Chloroplastida)

*Timarcha cyanescens* Fairmaire, 1862 (Arthropoda)

*Zygaena occitanica* (Villers, 1789) (Arthropoda)



9 771887 506008