



Num. 941. Publicado el 10/04/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Linaria vettonica*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 941. Publicado el 10/04/2023

Descripciones de especies

Sedum caespitosum (Cav.) DC.

Planta anual, glabra, rojiza. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallo (1,5)2-4(7) cm, erecto, a menudo ramificado desde la base. Hojas de (2)2,...

Pastos secos terofíticos; 70-1450 m....

Región mediterránea y SW de Asia. Prácticamente por toda la Península, exceptuadas algunas zonas de N y del W....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-caespitosum>

Lixus juncii Boheman, 1835

Insecto con una longitud de 9 a 15 mm. Cuerpo alargado, con pubescencia dorsal cenicienta, muy corto y muy fino, bastante denso pero sin ocultar los t...

Conocido como gorgojo de la acelga, es una especie polífaga que se alimenta de especies de Beta, Atriplex, Spinacia, Brassica, Vicia, Rumex acetosa y ...

Centro, sur de Europa, así como Siria, Egipto, Argelia y Marruecos....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lixus-juncii>

Linaria vettonica Luceño, Mazuecos & P. Vargas

Planta herbácea bianual o perenne, glauca, glabra en la parte inferior, densamente glandulosa pubescente en la inflorescencia y parte superior de los ...

Linaria vettonica crece en zonas aclaradas de melojares (*Quercus pyrenaica*), taludes y suelos arenosos silíceos: 470-1250 m....

Endemismo de los montes meridionales del C y O de la Sierra de Gredos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-vettonica>

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758)

Escarabajo con una longitud de 5,8 a 8,2 milímetros. De colores brillantes con élitros azules o verdes, protórax rojo óxido y cabeza azul oscuro. An...

Los escarabajos se pueden encontrar, en invierno y primavera, desde las llanuras hasta los 1450 m. El hábitat lo constituyen lugares secos,



preferent...

Extendido en Europa pero raro. El límite norte del área de distribución pasa por el sur de Inglaterra, el sur de Noruega, el sur de Suecia y el sur de...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lebia-cyanocephala>

Coloeus monedula (Linnaeus, 1758)

La grajilla occidental es un ave de tamaño más modesto que grajas y cornejas, con 30-34 cm de longitud y 64-73 cm de envergadura. Presenta un plumaje ...

La grajilla está muy ligada a la existencia de cortados rocosos, paredones y desplomes, y su presencia aparece condicionada en cierta medida por la ex...

La grajilla occidental es una especie de amplia distribución por todo el Paleártico occidental, donde se extiende hasta los confines de Mongolia y el ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coloeus-monedula>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Linaria vettonica Luceño, Mazuecos & P. Vargas (Chloroplastida)

Lixus scabricollis Boheman, 1842 (Arthropoda)

Syricoris rivulana (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

