



Num. 947. Publicado el 22/05/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Centaurea triumfettii* subsp. *semidecurrans*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 947. Publicado el 22/05/2023

Descripciones de especies

Sagina procumbens L.

Planta perenne, cespitosa. Tallo principal corto; los laterales, de hasta 20 cm, numerosos, radicantes en la base, ascendentes y ramosos. Hojas de (3)5...

Lugares arenosos, húmedos, junto a los cursos de agua y cunetas inundadas; 0-3000 m....

Europa, N de África, Asia, N de América y Macaronesia. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, más frecuente en la mitad occidental. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sagina-procumbens>

Rhytideres plicatus (Olivier, 1790)

Insecto con una longitud de 6,5 a 14 mm. Oblongo, deprimido dorsalmente, negro, cubierto dorsalmente con escamas ovales, fuertemente imbricadas, gris,...

Las plantas nutricias de esta especie son resedáceas y crucíferas. Las larvas se alimentan en las raíces, en tanto que los adultos roen las hojas e in...

España, Francia, Grecia, Islas Canarias, Norte de África, Oriente Próximo, Sicilia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhytideres-plicatus>

Neatostema apulum (L.) I.M. Johnst.

Planta herbácea de (3)6-25(30) cm, erecta, hispida, con pelos de distinto tamaño, adpresos y patentes, hasta de 1,5(2) mm. Tallos simples o ramificado...

Indiferente edáfica, generalmente viaria y arvense; 0-1600 m....

Macaronesia, NW de África, S de Europa y SW de Asia. Prácticamente por toda la Península, excepto el extremo NW....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neatostema-apulum>

Halimium umbellatum subsp. *viscosum* (Willk.) O. Bolòs & Vigo

Sufrútice de hasta 70 cm de altura, generalmente con las ramas suberectas o erecto-patentes, a veces de corta talla y ramas difusas. Hojas de las ramas...

Jarales, jaguarzales y excepcionalmente brezales, en climas secos y suelo ácido, arenoso y cascajoso; 30-1900 m....

Península Ibérica, Marruecos y NE de Argelia. Disperso por gran parte de la Península Ibérica, falta o casi en el tercio N -solo se conoce de la



Sierr...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halimium-umbellatum-subsp-viscosum>

Anthomalachius spinosus (Erichson, 1840)

Insecto con una longitud de 4,50 a 5,50 mm. Cuerpo alargado de color verde azulado o azul, con brillo metálico. Recubierto por una doble pubescencia,...

Los imagos se pueden encontrar en flores y hierbas y, como es común en Malachiidae, se alimentan de polen y son parcialmente zoófagos. Las larvas son ...

Elemento circummediterráneo, se extiende por Europa central y meridional desde Portugal a Ucrania y, en el Norte de África, desde Marruecos a Túnez....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthomalachius-spinosus>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carex quixotiana Ben.Benítez, Martín-Bravo, Luceño & Jim.Mejías (Chloroplastida)

Centaurea triumfettii subsp. semidecurrens (Jord.) Dostál (Chloroplastida)

Halimium umbellatum subsp. umbellatum (L.) Spach (Chloroplastida)

Halimium umbellatum subsp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo (Chloroplastida)

Ramalina pusilla Duby (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

