



Num. 951. Publicado el 19/06/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Apis mellifera*. Por José Rafael González López



Num. 951. Publicado el 19/06/2023

Descripciones de especies

Sorghum halepense (L.) Pers.

Hierba perenne, rizomatosa. Rizomas de 0,4-2 cm de diámetro, largos, estoloníferos, ramificados, subcilíndricos, con entrenudos de 1-2,5 cm, con un ca...

Cultivos de regadío, cunetas, taludes o bordes de acequias, en suelos húmedos, profundos y nitrificados; 0-1800 m....

Oriunda del E de la Región Mediterránea, SW de Asia y quizá N de la India; introducida y naturalizada en casi todas las regiones tropicales, subtropic...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sorghum-halepense>

Rumex acetosella L.

Planta perenne, 5-45(80) cm, verde o glauca, a veces de cepa un poco leñosa. Rizoma bien desarrollado, a veces estolonífero. Hojas (3)6-60(100) x (0,5)...

Pastos en sustratos silíceos....

Zonas templadas y frías del Hemisferio N; ampliamente extendida como mala hierba y en la actualidad subcosmopolita....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-acetosella>

Phagnalon rupestre subsp. *rupestre* (L.) DC.

Sufrútice hasta de 50 cm, aromático. Tallos densamente tomentosos o lanoso-tomentosos. Hojas (5)10-35(45) x (0,3)1,9-4,7(10,5) mm, de lineares a lanceo...

Claros de matorral, baldíos, fisuras y repisas de roquedo, arenas, en sustrato preferentemente calcáreo, de manera ocasional silíceo; 0-1100(1500) m....

Regiones Macaronésica, Mediterránea, Irano-Turánica y Saharo-Arábica; llega por el oriente hasta el N de Irán. Distribuida principalmente por la mitad...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phagnalon-rupestre-subsp-rupestre>

Malva trifida Cav.

Hierba anual. Tallos 20-60(100) cm, simples o ramosos en la base, glabros, a veces esparcidamente escabros. Hojas basales (1)3-8 x 4-10 cm, de suborbi...



Campos incultos, baldíos, en suelos arcillosos; 0-100 m....

NW de África. Cultivada por sus muy llamativas flores y ocasionalmente naturalizada o subespontánea en Europa y SW de Asia. SW de España, naturalizada...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/malva-trifida>

Labidostomis lusitanica (Germar, 1823)

Crisomélido con un tamaño de 5,5 a 10mm siendo los machos más grandes que las hembras. Élitros de coloración naranja portando un punto negro en la zon...

Se alimentan en primavera de las hojas tiernas de los árboles y arbustos, especialmente de brotes nuevos, de frutales, Populus, Vitis, Quercus, Ilegan...

Vuela en mayo y Junio y es frecuente verlos en grupos reunidos en la misma planta. Elemento mediterráneo occidental, se encuentra distribuido por Port...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/labidostomis-lusitanica>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aedes japonicus (Theobald, 1901) (Arthropoda)

Byssoloma leucoblepharum (Nyl.) Vain. (Ascomycota)

Cyathea lunulata Copel. (Chloroplastida)

Danae racemosa Moench (Chloroplastida)

Poa trivialis subsp. *trivialis* L. (Chloroplastida)

Ranunculus pseudomillefoliatus Grau (Chloroplastida)

Salvia lavandulifolia Vahl (Chloroplastida)

Salvia lavandulifolia subsp. *blancoana* (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca (Chloroplastida)

Salvia lavandulifolia subsp. *mariolensis* (Figuerola) Alcaraz & De la Torre (Chloroplastida)



Salvia lavandulifolia subsp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas Goday & Rivas Mart. (Chloroplastida)

Salvia lavandulifolia subsp. vellerea (Cuatrec.) Rivas Goday & Rivas Mart. (Chloroplastida)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008