



## Num. 956. Publicado el 24/07/2023

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Pentaphylloides fruticosa* subsp. *floribunda*. Por César Fernández González



**Num. 956. Publicado el 24/07/2023**

## Descripciones de especies

### *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link

Planta perenne, de cepa algo leñosa de tallos 5-45(50) cm, numerosos, erecto-ascendentes o difusos, más o menos gráciles, rígidos, glabros o escábrido...

Pastos secos perennes y comunidades saxícolas; 0-1400 m....

Centro y sur de Europa, SW de Asia, naturalizada en Suecia, Gran Bretaña y Norteamérica. Levante, cuenca baja del Duero y provincia de Málaga.  
...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/petrorhagia-saxifraga>

### *Pecopteris melendezii* Wagner, 1962

El género *Pecopteris* engloba Frondes quizás a veces bipinnados, pero más comúnmente tripinnados o cuadripinnatífidos o incluso cuadripinnados.  
Raquis ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pecopteris-melendezii>

### *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinulosa, pelosa. Tallos 90-120 cm, simples o apenas ramificados, ápteros, rara vez alados solo cer...

Herbazales de bordes de arroyo y, en general, en lugares frescos y húmedos, en bosques mixtos, etc.; (500)800-1300 m....

Casi toda Europa, excepto la cuenca mediterránea y el extremo SW. N de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-heterophyllum>

### *Chaenorhinum robustum* Loscos

Hierba anual, de 6-30 cm, glandular-pubescente, con indumento heterótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm, pluricelulares, tr...

Claros del matorral, márgenes de cultivos de secano, ramblas secas, preferentemente en suelos pedregosos calizos; 400-1500(1800) m. ...

Endemismo de la mitad oriental de la Península Ibérica, excepto en el NE y SE. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-robustum>



*Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv.

Hierba perenne, rizomatosa, con brotes extravaginales y rizoma rastrero más o menos largo, con catafilos glabros. Tallos (30)40-100(125) cm, erectos, ...

Prados más o menos frescos o húmedos, ribazos, matorrales, pedregales, bordes de caminos, etc., en todo tipo de substratos; 0-2100 m....

En la mayor parte de Europa, W, SW y C de Asia, hasta Siberia, China y Mongolia, y se menciona también del NW de África y Eritrea; introducido en Nort...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brachypodium-pinnatum>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Dacrydium cupressinum* Sol. ex G.Forst. (Chloroplastida)

*Daphniphyllum macropodum* Miq. (Chloroplastida)

*Lepra albescens* (Huds.) Hafellner, in Hafellner & Türk (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

