



Num. 956. Publicado el 24/07/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pentaphylloides fruticosa subsp. floribunda*. Por César Fernández González



Num. 956. Publicado el 24/07/2023

Descripciones de especies

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Planta perenne, de cepa algo leñosa de tallos 5-45(50) cm, numerosos, erecto-ascendentes o difusos, más o menos gráciles, rígidos, glabros o escá...

Pastos secos perennes y comunidades saxícolas; 0-1400 m....

Centro y sur de Europa, SW de Asia, naturalizada en Suecia, Gran Bretaña y Norteamérica. Levante, cuenca baja del Duero y provincia de Málaga.

...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/petrorhagia-saxifraga>

Pecopteris melendezii Wagner, 1962

El género Pecopteris engloba Frondes quizás a veces bipinnados, pero más comúnmente tripinnados o cuadripinnatífidos o incluso cuadripinnados.

Ra...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pecopteris-melendezii>

Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinulosa, pelosa. Tallos 90-120 cm, simples o apenas ramificados, ápteros, rara vez alados solo

c...

Herbazales de bordes de arroyo y, en general, en lugares frescos y húmedos, en bosques mixtos, etc.; (500)800-1300 m....

Casi toda Europa, excepto la cuenca mediterránea y el extremo SW. N de España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cirsium-heterophyllum>

Chaenorhinum robustum Loscos

Hierba anual, de 6-30 cm, glandular-pubescente, con indumento heterótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm,

pluricelulares, ...

Claros del matorral, márgenes de cultivos de secano, ramblas secas, preferentemente en suelos pedregosos calizos; 400-1500(1800) m. ...

Endemismo de la mitad oriental de la Península Ibérica, excepto en el NE y SE. ...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-robustum>

***Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv.**

Hierba perenne, rizomatosa, con brotes extravaginales y rizoma rastrero más o menos largo, con catafilos glabros. Tallos (30)40-100(125) cm, erectos,...

Prados más o menos frescos o húmedos, ribazos, matorrales, pedregales, bordes de caminos, etc., en todo tipo de substratos; 0-2100 m....

En la mayor parte de Europa, W, SW y C de Asia, hasta Siberia, China y Mongolia, y se menciona también del NW de África y Eritrea; introducido en No...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/brachypodium-pinnatum>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dacrydium cupressinum Sol. ex G.Forst. (Chloroplastida)

Daphniphyllum macropodum Miq. (Chloroplastida)

Leptra albescens (Huds.) Hafellner, in Hafellner & Türk (Ascomycota)

