



## Num. 985. Publicado el 12/02/2024

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Egretta garzetta*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 985. Publicado el 12/02/2024

## Descripciones de especies

*Lourdesiella falcatum* Bernabé, Huertas & Vives

Especie con una envergadura de 8 a 10,5mm. Cabeza bien desarrollada, sin ocelos; vértex con pelos escamiformes enfrentados. Palpos labiales bien desar...

Las orugas se alimentan de *Lonicera periclymenum* subsp. *hispanica*. Se desplazan por las hojas y tallos alimentándose de los numerosos pelillos glandul...

Se desconoce la distribución real de esta especie. La hipótesis de que coincida con la de su único huésped conocido hasta ahora, *Lonicera periclymenum*...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lourdesiella-falcatum>

*Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth

Perenne; rizoma de entrenudos largos, a veces ramificado, del que nacen renuevos y tallos más o menos densos, con lo que la planta aparenta ser laxame...

Bordes de pantano, herbazales húmedos, etc.; 10-640 m....

Región mediterránea, Creta, SW y S de Asia, África Tropical hasta Sudáfrica y Australia, India y Afganistán. Cuadrante SW de la Península....

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fuirena-pubescens>

*Fimbristylis bisumbellata* (Forssk.) Bubani

Herbácea, anual, de color verde grisáceo. Tallos 3-15 cm x 0,5-1(1,14) mm, de erectos a ascendentes, trígono, profundamente estriados, glabros, lisos...

Suelos arenosos temporalmente inundados en colas de embalses, bordes de charcas y cursos de agua; 10-750 m....

Región mediterránea de Europa y África; W de Asia y puntos aislados de los trópicos asiáticos. En la Península Ibérica habita en puntos aislados de la...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fimbristylis-bisumbellata>

*Eleocharis mamillata* subsp. *austriaca* (Hayek) Strandh.



Perenne; rizoma de entrenudos más o menos largos, de 2-3,5 mm de diámetro, rojizo o pardo, cubierto de escamas translúcidas cuando joven. Tallos 13-50...

Turberas y bordes de laguna; 500-2400 m....

Montañas europeas desde el N de la Península Ibérica hasta el Cáucaso y los Urales. Dispersa por los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-mamillata-subsp-austriaca>

## *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb.

Perenne, más o menos cespitosa, glaucescente. Tallos (2,5)6-22(34) cm x (0,2)0,5-0,7(1) mm, erectos o arqueados, estriados. Vainas verdes, purpúreas o ...

Marismas y arrozales, generalmente sobre substrato arenoso; 0-30 m....

Nativa de América; naturalizada en Portugal, Baleares y N de Italia. ...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-flavescens>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cladonia rei* Schaer. (Ascomycota)

*Gyalecta fagicola* (Arnold) Kremp. (Ascomycota)

