



## Num. 995. Publicado el 22/04/2024

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Trybliocrinus flatheanus*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 995. Publicado el 22/04/2024**

## Descripciones de especies

*Situlacrinus costatus* Breimer, 1962

Especie del género *Situlacrinus* caracterizada por el fuerte acanalado de las placas del cáliz. Este carácter se interpreta como de nivel específico, c...

El género aparece en el Devónico Inferior (Emsiense) en la provincia de León (España)....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/situlacrinus-costatus>

*Lathyrus pulcher* J. Gay

Hierba perenne, con rizomas delgados, glabra, con glándulas rojas en las partes jóvenes. Tallos hasta de 100 cm, decumbentes, rara vez erectos, ramifi...

Pastizales, pedregales, claros de matorral, cunetas, bordes de cultivo, en zonas húmedas, con preferencia, sobre calizas; 50-1300 m....

España y NW de África. E y SE de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-pulcher>

*Festuca henriquesii* Hack.

Hierba perenne, densamente cespitosa, con brotes intravaginales. Tallos 20-55(70) cm, cilíndricos, con entrenudos estriado-acostillados, verdes, con 1...

Herbazales en enclaves húmedos junto a cunetas, cervunales, pastos y claros de matorral, silicícola; (1150)1500-1950 m. ...

Península Ibérica. N y NE de Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/festuca-henriquesii>

*Beltanelliformis brunsae* Menner in Keller et al., 1974

Fósil de aspecto redondeado, si están densamente dispuestos aparecen con forma poligonal. Son estructuras biogénicas simplemente organizadas sin eleme...

Colonias flotantes de algas....

Precámbrico tardío(Ediacárico, Vendiano) de Europa Oriental (formaciones de Mogilev, Yaryshev, Nagoryany, probablemente, formaciones de Khmelnitsky d...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/beltanelliformis-brunsae>



*Allacma fusca* (Linnaeus, 1758)

Colémbolo con una longitud corporal de 1,7 a 2,0 mm los machos, y de 1,8 a 2,1 mm las hembras (según otros autores pueden medir hasta 4 mm).  
Colorac...

Vive en bosques húmedos, donde se le puede observar en la capa de hojarasca y en la madera muerta, como ramas caídas y tocones de árboles; también se ...

Distribución holártica. Casi toda Europa, las regiones del Mediterráneo y del Mar Negro, Siberia, Canadá y Groenlandia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/allacma-fusca>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cupressocrinites sampelayoi* (Almela & Revilla, 1950) (Echinodermata)

*Oenochoacrinus scaber* Breimer, 1962 (Echinodermata)

*Pyxidocrinus collensis* Breimer, 1962 (Echinodermata)

*Situlacrinus costatus* Breimer, 1962 (Echinodermata)

*Streblote panda* Hübner, 1820 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

