



Num. 996. Publicado el 29/04/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Michelia crassipes*. Por César Fernández González



Num. 996. Publicado el 29/04/2024

Descripciones de especies

Streblote panda Hübner, 1820

El imago presenta unas antenas fuertemente bipectinadas curvadas hacia atrás, desde la base hasta la mitad de su longitud, y en la mitad frontal los d...

Vive en zonas de matorral sobre materiales halófilos, suelos arenosos, bordes de cultivos. Prefiere terrenos secos, evitando condiciones de humedad.E...

Sur de la península Ibérica (España, Portugal), Italia, y al otro lado del Mediterráneo en el norte de África desde Marruecos hasta Libia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/streblote-panda>

Genista falcata Brot.

Arbusto 0,5-2 m, erecto, espinoso. Tallo con ramas alternas, viloso, con indumento formado por pelos largos y más o menos patentes, y cortos, uncinado...

Roquedos o matorrales de degradación de alcornoques, castaños y melojares, sobre esquistos o granitos, rara vez en calizas cámbricas; 300-1250 m....

Especie endémica del centro y oeste de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-falcata>

Falsomelyris granulata (Fabricius, 1792)

Insecto con una longitud de 4,6 a 8 mm. Coloración general negra. Cabeza inclinada debajo del pronoto, reticulada con impresiones o mallas, verrugosa,...

España, Portugal, Baleares y Sicilia...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/falsomelyris-granulata>

Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)

El críalo europeo es un ave de tamaño medio, morfológicamente muy semejante al cuco, del que se diferencia por su aspecto más esbelto, por tener una c...

El críalo prefiere establecerse en áreas donde abundan las especies que parasita, especialmente la urraca. Por lo tanto, es más común encontrarlo en



Z...

El críalo europeo se encuentra en diversas regiones del centro y sur de África, con algunas poblaciones dispersas en el norte del continente y en Ori...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clamator-glandarius>

Athene noctua Scopoli, 1769

El mochuelo, un pájaro de aspecto regordete, se distingue principalmente por su cabeza grande y redondeada que carece de penachos cefálicos. Su plum...

El mochuelo europeo, adaptable en cuanto a hábitat, se encuentra cómodo en diversos entornos, desde bosques ribereños hasta parques urbanos y dehesa...

El mochuelo europeo se encuentra en Eurasia y el norte de África, ocupando la mayor parte de Europa, exceptuando áreas muy septentrionales y algunas...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/athene-noctua>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. (Chloroplastida)

Allium siculum Ucria (Chloroplastida)

Camellia longicarpa Hung T.Chang (Chloroplastida)

Darmera peltata (Torr.) Voss (Chloroplastida)

Michelia crassipes Y.W.Law (Chloroplastida)

Michelia figo (Lour.) Spreng. (Chloroplastida)

