



## Num. 997. Publicado el 06/05/2024

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Vanellus vanellus*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 997. Publicado el 06/05/2024**

## Descripciones de especies

*Pradocrinus baylii* Verneuil, 1850

Los especímenes grandes de *Pradocrinus baylii* alcanzan una altura de 80 mm y un ancho de 40 mm. La mayor anchura frecuentemente se encuentra a nivel d...

El género solo se encuentra en estratos del Emsiense inferior de las provincias de León y Asturias....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pradocrinus-baylii>

*Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789)

La pagaza piconegra, que tiene un tamaño que va desde mediano hasta grande y un aspecto generalmente pálido, puede ser confundida a primera vista con ...

La pagaza piconegra elige principalmente áreas de anidación en playas arenosas, islotes de lagunas y embalses, marismas salobres, lagunas salinas, áre...

La pagaza piconegra tiene una distribución global en Centroamérica, Sudamérica, Australia, suroeste de Asia, Oriente Medio, África y Eurasia, lo que l...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gelochelidon-nilotica>

*Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

El aguilucho lagunero es un ave rapaz de tamaño medio y apariencia elegante, aunque más robusta que otros aguiluchos de nuestra región y con una enver...

El aguilucho lagunero prefiere hábitats asociados a humedales, particularmente aquellos con densa vegetación como carrizos, espadañas, eneas, juncos o...

La distribución del aguilucho lagunero abarca una amplia extensión en el planeta, reproduciéndose en diversas regiones templadas y tropicales de ambos...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/circus-aeruginosus>

*Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

El búho campestre, con una longitud de 33-40 cm y una envergadura de 95-105 cm, presenta un cuerpo esbelto en comparación con otros pájaros nocturnos;...

El búho campestre prefiere áreas abiertas y sin muchos árboles, como campos cultivados, praderas y zonas húmedas con arbustos dispersos. En



España, se...

El búho campestre es una especie que se distribuye ampliamente, reproduciéndose principalmente en áreas con climas más fríos, abarcando desde la mitad...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asio-flammeus>

## *Acinipe hesperica* Rambur, 1838

Es la especie de mayor tamaño de todos los Acridoidea españoles. Saltamontes de aspecto rugoso cuyas hembras tienen una longitud de 63 a 73,5 mm, midi...

Habita en lugares secos y cálidos con vegetación dispersa, garrigas, pinares y valles de montaña soleados. En España se distribuye desde el nivel del ...

La especie se distribuye principalmente por el sur de España, hasta Teruel, y por la franja atlántica y mediterránea de África del Norte...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acinipe-hesperica>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Dryomyza anilis* Fallén, 1820 (Arthropoda)

*Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

