



Num. 1. Publicado el 13/12/2004

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Saxifraga trifurcata*. Por José Luis Porto Torres



Num. 1. Publicado el 13/12/2004

Descripciones de especies

Ulva lactuca L.

Talo verde laminar, foliáceo, lobulado, formado por 2 capas de células, fijado al sustrato por rizoides que crecen como expansiones de las células bas...

En intermareal, en charcas, rocas o sublitoral hasta 20 m. Al tolerar salinidades bajas puede encontrarse en estuarios, y también frecuentemente en zo...

Presente en casi todos los mares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulva-lactuca.html>

Ulva intestinalis L.

Talo verde laminar, tubular, más estrecho en la zona basal y formado por 2 capas de células. Mide unos 30 cm de largo y hasta 3 cm de ancho, y no está...

En rocas, piedras, charcas de marea, desde el intermareal al submareal....

Presente en casi todos los mares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulva-intestinalis.html>

Stypocaulon scoparium Kütz. (L.)

Mata de 9 - 15 cm de longitud, pardo oscuro, formado por un eje principal que se ramifica alternamente para originar unas ramas empenachadas, de tacto...

Desde el nivel medio de la marea, en rocas, charcas, en lugares batidos y arenosos....

Desde Noruega a Cabo Verde y el Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stypocaulon-scoparium.html>

Dictyota dichotoma J.V.Lamour. (Huds.)

Fronde delicado, transparente, acintado, de anchura variable hasta 1 cm. Ramificación dicótoma, sin nervio central y acabado en ápices redondeados y h...



Desde el nivel medio de la marea, sobre piedras, rocas o epífita en *Cystoseira*....

Cosmopolita....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dictyota-dichotoma.html>

Dictyopteris polypodioides (A.P.De Candolle) J.V.Lamouroux

Alga parda con una fronde de unos 30 cm de longitud, verdoso o pardo amarillento, que surge de un grueso disco basal, aplastado y de aspecto membranosos...

Intermareal y submareal hasta 80 m, en rocas, piedras, en lugares poco batidos y sombreados, normalmente bajo láminas de *Laminaria*....

Desde las Islas Británicas a Mauritania y Mediterráneo. Este africano, Japón y Filipinas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dictyopteris-polypodioides.html>

Desmarestia ligulata J.V.Lamouroux (Stackhouse)

Alga pardo amarillento que puede alcanzar 2 m de longitud. El talo está formado por un eje principal aplanado, foliáceo, de un centímetro de ancho, y ...

Mediolitoral en charcas y en aguas someras....

Desde Noruega hasta Marruecos, en el Mediterráneo sólo en Sicilia. Japón, costa NO de América, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Hawai...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/desmarestia-ligulata.html>

Desmarestia aculeata J.V.Lamour. (L.)

Talo pardo amarillento de unos 2 m de longitud que surge de un disco basal, constituido por un eje principal aplanado, de 3 mm de ancho en la base, qu...

Intermareal, sublitoral, en charcas, rocas, hasta los 15 m....

Desde Escandinavia hasta el Mediterráneo. Costa NE y NO de América....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/desmarestia-aculeata.html>

Codium tomentosum Stackhouse, 1797

Fronde de color de verde claro a verde oscuro, ramificada dicotómicamente y que está fijada al sustrato por un disco esponjoso; alcanza hasta 25



cm, t...

Intermareal, en charcas, rocas, arena y fango, y en sublitoral hasta los 20 m....

Desde las Islas Británicas a Cabo Verde, Mediterráneo, este de África, sur de Asia, California....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/codium-tomentosum.html>

Codium adhaerens C. Agardh

El talo forma una especie de almohadilla de color verde oscuro, muy adherido al sustrato, de 5 - 10 mm de grosor, liso o rugoso, lobulado, y a veces ...

Cubre la superficie de rocas en el sublitoral, en condiciones de poca luz y mucho flujo de agua, a veces orientadas al norte....

Desde las Islas Británicas a Marruecos. Japón, Vietnam y la Antártida. Se cree que en el Mediterráneo la especie que aparece es *Codium effusum* y no Co...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/codium-adhaerens.html>

Cladostephus spongiosus C. Agardh (Huds.)

Talo pardo oscuro, de 10 a 30 cm de longitud, formado por una serie de ejes ramificados más o menos dicotómicamente, recubiertos por ramas laterales p...

Zona superior del sublitoral, en rocas y cubetas arenosas....

Desde Escandinavia e Islandia hasta las Canarias y el Mediterráneo occidental. También en Australia Nueva Zelanda....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cladostephus-spongiosus.html>

ISSN 1887-5068

