



Num. 100. Publicado el 06/11/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Tricholoma josserandii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 100. Publicado el 06/11/2006

Descripciones de especies

Trentepohlia abietina (Flotow) Hansgirg

Alga terrestre que forma pequeños parches ligeramente almohadillados, de hasta 2 mm de altura, que están formados por un sistema de filamentos uniseri...

Aunque está principalmente ligada a cortezas de árboles como alisos, cerezos y hayas entre otros, también es posible encontrarla en cortes calizos en ...

Se encuentra ampliamente distribuida por la zona templada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trentepohlia-abietina.html>

Solanum nigrum L.

Planta anual, en ocasiones perennante y algo lignificada en la base, de hasta 70 cm, subglabra, con indumento formado por pelos simples adpresos. Los ...

Vive en zonas alteradas y cultivos abandonados, de 10 a 1000 m....

Aparece en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/solanum-nigrum.html>

Oudemansiella mucida (Schrad.) V. Hoehn

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero convexo - hemisférico de 8 a 10 cm de diámetro, de margen estriado, cu...

Una especie que sólo es posible encontrar en troncos, tocones y ramas caídas de hayas (*Fagus sylvatica*)....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oudemansiella-mucida.html>

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), completamente teñidas de violeta, tienen un sombrero de 5 a 8 cm de diámetro, convexo a...

Aparece en bosques húmedos sombreados, entre la hojarasca o los musgos....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-amethystina.html>

Hygrocybe psittacina (Sch.) Kumm.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 5 a 35 mm de diámetro, de hemisférico a campanulado, más tarde aplanado, con un umbo diferenciado, viscido,...

Crece en prados, pastos y zonas herbosas húmedas desde finales de verano a otoño....

Aparece en Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica, Japón y la zona no ártica de Groenlandia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-psittacina.html>

Gymnopilus spectabilis (Weinm.: Fr.) A.H. Smith

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de unos 8 cm de diámetro, de hemisférico a aplanado, redondeado, de col...

Aparece sobre tocones y ramas caídas de planifolios y a veces de coníferas, generalmente formando céspedes....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gymnopilus-spectabilis.html>

Cortinarius praestans (Codier) Gill.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), de apariencia robusta, con un sombrero de 15 a 25 cm de diámetro, de color pardo rojizo...

Crece en bosques de caducifolios, como robledales y hayedos, en suelos calcáreos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-praestans.html>

Cantharellus cibarius Fr.

Seta que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero grueso y carnoso de 4-12 cm, primero convexo y después extendido y deprim...

Es un hongo que al ser micorrizógeno se encuentra asociado a diversos planifolios y alguna conífera, como robles (*Quercus robur*), encinas (*Quercus ilex*)...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cantharellus-cibarius.html>



Athyrium filix-femina (L.) Roth

Helecho perenne, provisto de un corto rizoma que aparece cubierto por restos de peciolos y en ocasiones ramificado. De él surgen frondes amacolladas y...

Crece en formaciones forestales en las que está garantizada una humedad y umbría permanente, de forma que su sistema radicular esté inundado constante...

Está presente en Europa, Asia, el norte de África y de América. En la península aparece en su parte norte occidental....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/athyrium-filix-femina.html>

Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas) con un sombrero de 2 a 5 cm, convexo, primero blanquecinos y que luego se cubren de un p...

Vive sobre sombreros en putrefacción de *Russula nigricans* y especies afines....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asterophora-lycoperdoides.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aplysina cavernicola (Porifera)

Bidens aurea (Magnoliophyta)

Cortinarius praestans (Cordier) Gillet (Basidiomycota)

Culcita macrocarpa C. Presl (Pteridophyta)

Hygrocybe virginea (Wulfen) P. D. Orton & Watling (Basidiomycota)

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (Basidiomycota)

Phallus impudicus L. (Basidiomycota)

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire (Basidiomycota)



Psathyrella multipedata (Peck.) A. H. Sm. (Basidiomycota)

Ruscus aculeatus L. (Magnoliophyta)

Artículos

Equinodermos; lirios de mar, estrellas, erizos, ...

Por Menéndez Valderrey, J.L.

